SNU-16

305273

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

Bunková línia SNU-16 je odvodená od slabo diferencovaného karcinómu žalúdka dospelého človeka. Táto bunková línia sa vo veľkej miere používa pri výskume rakoviny žalúdka a ponúka model na štúdium molekulárnych a bunkových mechanizmov, ktoré sa podieľajú na vývoji a progresii adenokarcinómu žalúdka. Bunky SNU-16 sú obzvlášť cenné na skúmanie genetických zmien, signálnych transdukčných dráh a nádorového mikroprostredia spojeného s touto agresívnou formou rakoviny žalúdka.
Bunky SNU-16 majú epitelovú morfológiu a vyznačujú sa expresiou markerov karcinómu žalúdka vrátane karcinoembryonálneho antigénu (CEA) a rôznych cytokeratínov. Je o nich známe, že majú amplifikáciu génu c-MET a nadmernú expresiu receptora MET, ktorý zohráva významnú úlohu pri raste, prežívaní a metastázovaní buniek. Výskumníci používajú bunky SNU-16 na skúmanie úlohy signálnej dráhy MET pri rakovine žalúdka a na hodnotenie účinnosti inhibítorov MET a iných cielených terapií. Okrem toho sa bunky SNU-16 využívajú pri štúdiách rezistencie voči liekom, vysoko výkonných skríningových testoch a predklinickom testovaní nových chemoterapeutík. Význam bunkovej línie SNU-16 vo výskume rakoviny žalúdka podčiarkuje jej dôležitosť pre lepšie pochopenie tohto ochorenia a vývoj účinnejších stratégií liečby pacientov s rakovinou žalúdka.

Tkanivo	Žalúdok
Choroba	Adenokarcinóm
Miesto metastáz	Ascites

Synonymá

- SNU16
- NCI-SNU-16

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Žena
Rastové vlastnosti	Zavesenie
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Epitelové
Tumorigenický	Áno, v polotuhom médiu

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

SNU-16 (katalógové číslo Cytion 305273)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_0076

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Povrchové antigény

Krvná skupina A, Rh+, karcinoembryonálny antigén (CEA) a TAG 72

Onkogény

Myc +, erb-B2 +

Mutčný profil

Mutácia: Lys1358fs*2 (c.4065_4066insTTGA), heterozygotná; mutácia: p.Lys1358fs*2 (c.4065_4066insTTGA), heterozygotná; mutácia: p.Lys1358fs*2 (c.4065_4066insTTGA), heterozygotná: TP53, p.Tyr205Phe (c.614A>T), homozygotná

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilný glutamín, w: 2,0 g/L NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10 % FBS, 25 mM HEPES

Rozmnožovanie kultúr

Suspenzné bunky: Odstráňte bunky zo substrátu pipetovaním s čerstvým médiom. Ak chcete získať jednotlivé bunky, niekoľkokrát prejdite suspenziu cez ihlu s priemerom 22 a dávkujte do nových baniek.

Obnova kvapaliny	2 krát týždenne

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	33 rokov
Etnická príslušnosť	Východná Ázia

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes

PODROBNOSTI O PRODUKTE

Tabuľka zloženia