SNU-398

305274

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

A SNU-398 sejtvonal egy felnőtt ember hepatocelluláris karcinómájából (HCC) származik. Ezt a sejtvonalat széles körben használják a májrákkutatásban a hepatokarcinogenezis, a tumor progressziója és a terápiás stratégiák kifejlesztésének alapjául szolgáló molekuláris mechanizmusok tanulmányozására. A hepatocelluláris karcinóma a májrák egyik elterjedt és halálos kimenetelű formája, és a SNU-398 sejtek releváns modellt biztosítanak a betegséggel kapcsolatos genetikai és epigenetikai változások vizsgálatához.
A SNU-398 sejtek epiteliális morfológiát mutatnak, és a májrákra jellemző markereket, például alfa-fetoproteint (AFP) és citokeratinokat expresszálnak. A HCC-re jellemző genetikai mutációkat és elváltozásokat hordoznak, beleértve a TP53 gén mutációit, amely számos rákos megbetegedéssel gyakran összefüggésbe hozható. A kutatók a SNU-398 sejteket a májrákban szerepet játszó különböző jelátviteli útvonalak, például a Wnt/β-katenin, PI3K/Akt és MAPK útvonalak feltárására használják. Ezeket a sejteket a kemoterápiás szerek és a célzott terápiák hatékonyságának értékelésére szolgáló gyógyszer-szűrési vizsgálatokban, valamint a hagyományos kezelésekkel szembeni rezisztencia mechanizmusait vizsgáló tanulmányokban is alkalmazzák. A SNU-398 sejtvonal jelentősége a hepatocelluláris karcinóma kutatásában abban rejlik, hogy képes modellezni a májrák biológiáját, és hozzájárul a májrákos betegek számára hatékonyabb terápiák kifejlesztéséhez.

Szövet	Máj
Betegség	Felnőttkori hepatocelluláris karcinóma

Szinonimák

- SNU398
- NCI-SNU-398

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Férfi
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Morfológia	Epithelialis

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

SNU-398 (Cytion katalógusszám: 305274)

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_0077

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Felszíni antigének

Vércsoport 0, Rh +

Mutációs profil

Mutáció: CTNNB1, p.Ser37Cys (c.110C>G), heterozigóta; Mutáció: CTNNB1, p.Ser37Cys (c.110C>G), heterozigóta: TP53, p.Ser215Ile (c.644G>T), heterozigóta

Vírusok

Transzformáns: Hepatitis B vírus (HBV)

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion 820700a cikkszám)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A tápfolyadékot egészítsük ki 10% hővel inaktivált FBS-szel, 25 mM HEPES

Diszociációs reagens	Accutase

Átültetés

Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

Folyadékcsere	hetente 2-3 alkalommal

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	42 év
Etnikai hovatartozás	Koreai

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes