NCI-H526

305278

GENERAL INFORMATION

Description

A linhagem celular NCI-H526 é derivada de um carcinoma pulmonar de pequenas células (SCLC) de um adulto humano. Essa linhagem celular é amplamente utilizada na pesquisa sobre o câncer, particularmente no estudo do câncer de pulmão de pequenas células, conhecido por sua natureza agressiva e mau prognóstico. As células NCI-H526 constituem um modelo crucial para investigar a biologia do SCLC, compreender seu rápido crescimento e metástase e desenvolver novas estratégias terapêuticas.
As células NCI-H526 apresentam uma morfologia arredondada, com crescimento em suspensão, característica do câncer de pulmão de pequenas células. Elas expressam marcadores neuroendócrinos, como a cromogranina A e a sinaptofisina, que são típicos do SCLC. Pesquisadores utilizam as células NCI-H526 para estudar as alterações genéticas e epigenéticas associadas ao SCLC, incluindo alterações nos genes TP53 e RB1, que frequentemente apresentam mutações nesse tipo de câncer. Essas células também são empregadas para explorar vias de sinalização que impulsionam a progressão do SCLC, como as vias Notch, PI3K/Akt e Hedgehog. Na descoberta e no desenvolvimento de medicamentos, as células NCI-H526 são utilizadas para avaliar a eficácia de agentes quimioterápicos, terapias direcionadas e novas combinações de tratamento. A relevância da linhagem celular NCI-H526 na pesquisa do câncer de pulmão de pequenas células ressalta sua importância no avanço de nossa compreensão dessa doença desafiadora e no desenvolvimento de tratamentos mais eficazes.

Tissue	Pulmão
Disease	Carcinoma de pequenas células
Metastatic site	Medula óssea

Synonyms

- H526
- H-526
- NCIH526

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	Epithelial
Tumourigenic	Sim, em camundongos atímicos

IDENTIFIERS

Citation

NCI-H526 (número de catálogo da Cytion 305278)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1569

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Oncogenes

Myc+, myb+, fes+, fms+, raf+, ras+

Mutational profile

Mutação: TP53, c.97-1G>C (IVS3-1G>C), homozigótica

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, com 2,0 mM de glutamina estável e 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artigo da Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5% de CO_2, atmosfera umidificada.

Supplements

Adicione 10% de FBS ao meio

Subculturing

Células em suspensão: Remova as células do substrato pipetando com meio fresco. Para obter células individuais, passe a suspensão várias vezes por uma agulha de calibre 22 e transfira-a para novos frascos.

Fluid renewal	2 a 3 vezes por semana

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

A contaminação por micoplasma é descartada por meio de ensaios baseados em PCR e de métodos de detecção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não haja contaminação por bactérias, fungos ou leveduras, as culturas celulares são submetidas a inspeções visuais diárias.

Freeze medium	Como meio de criopreservação, utilizamos meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% de DMSO para garantir viabilidade adequada após o descongelamento, ou CM-1 (número de catálogo da Cytion 800100), que inclui osmoprotetores e estabilizadores metabólicos otimizados para melhorar a recuperação e reduzir o estresse induzido pela criopreservação.

Storage conditions

Para preservação a longo prazo, coloque os frascos em nitrogênio líquido em fase de vapor a uma temperatura entre aproximadamente −150 e −196 °C. O armazenamento a −80 °C é aceitável apenas como uma etapa intermediária de curta duração antes da transferência para o nitrogênio líquido.

Shipping conditions

As linhagens celulares criopreservadas são enviadas em gelo seco, em embalagens isoladas e validadas, com refrigerante suficiente para manter a temperatura em aproximadamente −78 °C durante todo o transporte. Ao receber a remessa, inspecione o recipiente imediatamente e transfira os frascos sem demora para o local de armazenamento adequado.

DONOR

Donor age	55 anos
Ethnicity	Europeu

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Ao planejar o armazenamento de um criotubo em nitrogênio líquido para descongelamento futuro, é obrigatório seguir medidas de segurança rigorosas. É essencial o uso de luvas e roupas de proteção adequadas, além do uso obrigatório de máscara facial ou óculos de proteção durante a transferência de amostras congeladas para dentro ou para fora do tanque de nitrogênio líquido. Isso visa mitigar o risco de ferimentos decorrentes de possíveis explosões dos criotubos durante a remoção, o que pode resultar na projeção de fragmentos pontiagudos.

Warranty

Na Cytion, garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células permanecerão viáveis no início da cultura por
60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no
Certificado de Análise e/ou na Ficha Técnica do Produto.
Para obter todos os detalhes, consulte nossa
Declaração de Garantia.

Material Transfer Agreement required	Yes

PRODUCT DETAILS

Composition table