NCI-H522

305279

GENERAL INFORMATION

Description

NCI-H522 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□NSCLC□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□——□□——□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□NCI-H522 □□□

NCI-H522 □□□CEA□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ TP53 □□□□□ RB1 □ □□□□□ □□□□□□□ NCI-H522 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ EGFR□KRAS □ PI3K/Akt □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640□□ 2.0 mM □□□□□□□□ 2.0 g/L $NaHCO_3$□Cytion □□□□ 820700a□

Incubation atmosphere	37°C□5% CO_2□□□□□□

Supplements

□□□□□□□ 10% FBS□4.5 g/L □□□□10 mM HEPES□1 mM □□□□□ 1.5 g/L NaHCO3

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PBS□□□□□T25□□□□□3-5□□PBS□T75□□□□□□5-10□□□ □□□□ Accutase □□□□□□□T25 □□□□□ 1–2 □□□T75 □□□□□□ 2.5 □□□□□□□□□□□□ 8–10 □□□□□□□□ □□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 300xg □□ 3 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

□□□