NCI-H2009

305283

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

La línea celular NCI-H2009 procede de un carcinoma pulmonar humano de células no pequeñas (CPNM), concretamente de un adenocarcinoma. Esta línea celular se utiliza ampliamente en la investigación del cáncer de pulmón para estudiar los mecanismos moleculares y celulares subyacentes al adenocarcinoma, el subtipo más común de CPNM. Las células NCI-H2009 son valiosas para investigar mutaciones genéticas, vías de transducción de señales y respuestas terapéuticas asociadas al adenocarcinoma de pulmón.
Las células NCI-H2009 presentan una morfología epitelial y expresan marcadores característicos del adenocarcinoma de pulmón, como las citoqueratinas y el antígeno carcinoembrionario (CEA). Albergan alteraciones genéticas observadas con frecuencia en el CPNM, como mutaciones en el gen KRAS, que es fundamental en la señalización celular, el crecimiento y la supervivencia. Los investigadores utilizan las células NCI-H2009 para explorar vías de señalización clave implicadas en la progresión del cáncer de pulmón, como las vías EGFR, KRAS y PI3K/Akt. Estas células también se emplean en ensayos de cribado de fármacos de alto rendimiento y en pruebas preclínicas de agentes quimioterapéuticos, terapias dirigidas e inmunoterapias. Además, las células NCI-H2009 se utilizan para estudiar los mecanismos de resistencia a los fármacos y desarrollar estrategias para superarla. La relevancia de la línea celular NCI-H2009 en la investigación del adenocarcinoma de pulmón pone de relieve su importancia para avanzar en nuestra comprensión de la biología del cáncer de pulmón y para desarrollar enfoques terapéuticos nuevos y más eficaces para los pacientes con CPNM.

Pañuelo de papel	Pulmón
Enfermedad	Adenocarcinoma
Lugar de metástasis	Ganglio linfático

Sinónimos

- H2009
- H-2009
- NCIH2009

CLASIFICACIÓN

Organismo	Humano
Sexo	Mujer
Propiedades de crecimiento	Adherente
Nivel de bioseguridad	1

CARACTERÍSTICAS

Morfología	Epitelial

IDENTIFICADORES

Referencia

NCI-H2009 (número de catálogo 305283 de Cytion)

N.º de identificación fiscal del NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1514

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD

Perfil mutacional

Mutación: B2M, p.Met1Val (c.1A>G), heterocigoto; Mutación: B2M, p.Gln28Ter (c.82C>T), heterocigoto; Mutación: KRAS, p.Gly12Ala (c.35G>C), heterocigoto; Mutación: TERT, c.1-124C>T (c.228C>T) (C228T); Mutación: TP53, p.Arg273Leu (c.818G>T), homocigoto

Virus

Transformante: Virus de Epstein-Barr (VEB)

MANEJO Y CULTIVO

Medio de cultivo

Medio HITES suplementado
El medio base para esta línea celular es DF12. Para preparar el medio de crecimiento completo,
añada los siguientes componentes al medio base:
0,005 mg/ml de insulina
0,01 mg/ml de transferrina
30 nM de selenito de sodio (concentración final)
10 nM de hidrocortisona (concentración final)
10 nM beta-estradiol (conc. final)
2 mM adicionales de L-glutamina (para una conc. final de 4,5 mM)
5 % de suero fetal bovino (conc. final)

Atmósfera de incubación	37°C, 5%CO2, atmósfera humidificada.
Reactivo de disociación	Accutase

Subcultivo

Retire el medio antiguo de las células adheridas y lávelas con PBS que carezca de calcio y magnesio. Para matraces T25, utilice 3-5 ml de PBS, y para matraces T75, utilice 5-10 ml. A continuación, cubra completamente las células con Accutase, utilizando 1-2 ml para matraces T25 y 2,5 ml para matraces T75. Deje incubar las células a temperatura ambiente durante 8-10 minutos para desprenderlas. Tras la incubación, mezclar suavemente las células con 10 ml de medio para resuspenderlas y, a continuación, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Desechar el sobrenadante, resuspender las células en medio fresco y transferirlas a nuevos matraces que ya contengan medio fresco.

Renovación de fluidos	de 2 a 3 veces por semana

Descongelación y cultivo

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROL DE CALIDAD Y CRIOPRESERVACIÓN

Esterilidad

La contaminación por micoplasma se excluye utilizando tanto ensayos basados en la PCR como métodos de detección de micoplasma basados en la luminiscencia.
Para garantizar la ausencia de contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

Medio de congelación	Como medio de criopreservación, utilizamos el medio de crecimiento completo (incluido FBS) + 10% DMSO para una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo 800100 de Cytion), que incluye osmoprotectores optimizados y estabilizadores metabólicos para mejorar la recuperación y reducir el estrés crioinducido.

Condiciones de almacenamiento

Para la conservación a largo plazo, colocar los viales en nitrógeno líquido en fase vapor a una temperatura aproximada de -150 a -196 °C. El almacenamiento a -80 °C sólo es aceptable como breve paso intermedio antes de la transferencia al nitrógeno líquido.

Condiciones de envío

Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente -78 °C durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado.

DONANTE

Edad del donante	68 años
Origen étnico	Europea

ASPECTOS LEGALES Y DE SEGURIDAD

Medidas de seguridad

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su futura descongelación, es obligatorio cumplir estrictas medidas de seguridad. Es esencial utilizar guantes y ropa de protección adecuados, así como una mascarilla o gafas de seguridad durante el traslado de muestras congeladas desde o hacia el tanque de nitrógeno líquido. Con ello se pretende mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones crioviales al extraerlas, que pueden dar lugar a la proyección de fragmentos afilados.

Garantía

En Cytion, respaldamos la calidad y viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante los 60 días posteriores al envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales se ajustan a las especificaciones descritas en el Certificado de Análisis y/o Hoja de Producto
Para más información, consulte nuestra <a href=""/Quiénes somos/Garantía/"" hreflang=""x-default"">Declaración de garantía

Se requiere un acuerdo de transferencia de material	Yes