NCI-H2009

305283

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

Az NCI-H2009 sejtvonal emberi nem-kissejtes tüdőrákból (NSCLC), konkrétan adenokarcinómából származik. Ezt a sejtvonalat széles körben használják a tüdőrák kutatásában az adenokarcinóma, az NSCLC leggyakoribb altípusának molekuláris és sejtes mechanizmusainak tanulmányozására. Az NCI-H2009 sejtek értékesek a tüdőadenokarcinómával kapcsolatos genetikai mutációk, jelátviteli útvonalak és terápiás válaszok vizsgálatában.
Az NCI-H2009 sejtek epiteliális morfológiát mutatnak és a tüdőadenokarcinómára jellemző markereket expresszálnak, beleértve a citocheratinokat és a karcinoembrionális antigént (CEA). Az NSCLC-ben gyakran megfigyelt genetikai változásokat hordoznak, például a sejtek jelátvitelében, növekedésében és túlélésében kulcsfontosságú KRAS gén mutációit. A kutatók az NCI-H2009 sejteket használják a tüdőrák progressziójában szerepet játszó kulcsfontosságú jelátviteli útvonalak, például az EGFR, KRAS és PI3K/Akt útvonalak feltárására. Ezeket a sejteket nagy áteresztőképességű gyógyszerszűrési vizsgálatokban és kemoterápiás szerek, célzott terápiák és immunterápiák preklinikai tesztelésében is alkalmazzák. Emellett az NCI-H2009 sejteket gyógyszerrezisztencia mechanizmusainak tanulmányozására és a rezisztencia leküzdésére szolgáló stratégiák kidolgozására is használják. Az NCI-H2009 sejtvonal jelentőségét a tüdőadenokarcinóma kutatásában az emeli ki, hogy fontos szerepet játszik a tüdőrák biológiájának megértésében és új, hatékonyabb kezelési módszerek kidolgozásában a nem kissejtes tüdőrákos betegek számára.

Szövet	Tüdő
Betegség	Adenokarcinóma
Áttétes hely	Nyirokcsomó

Szinonimák

- H2009
- H-2009
- NCIH2009

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Nő
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Morfológia	Epithelialis

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

NCI-H2009 (Cytion katalógusszám: 305283)

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_1514

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Mutációs profil

Mutáció: B2M, p.Met1Val (c.1A>G), heterozigóta; Mutáció: B2M, p.Gln28Ter (c.82C>T), heterozigóta; Mutáció: KRAS, p.Gly12Ala (c.35G>C), heterozigóta; Mutáció: TERT, c.1-124C>T (c.228C>T) (C228T); Mutáció: TP53, p.Arg273Leu (c.818G>T), homozigóta

Vírusok

Transzformáns: Epstein-Barr-vírus (EBV)

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

HITES tápközeg kiegészítve
Ennek a sejtvonalnak az alap táptalaja a DF12. A teljes táptalaj elkészítéséhez
adja hozzá a következő összetevőket az alap táptalajhoz:
0,005 mg/ml inzulin
0,01 mg/ml transzferrin
30 nM nátrium-szelenit (végső koncentráció)
10 nM hidrokortizon (végső koncentráció)
10 nM béta-ösztradiol (végső koncentráció)
Extra 2 mM L-glutamin (4,5 mM végső koncentrációhoz)
5% borjú szérum (végső koncentráció)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.
Diszociációs reagens	Accutase

Átültetés

Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

Folyadékcsere	hetente 2-3 alkalommal

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	68 év
Etnikai hovatartozás	Európai

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes