NCI-H2009

305283

GENERAL INFORMATION

Description

NCI-H2009□□□□□□□□□□□□□□□□NSCLC□□□□□□□□□□□□□□□□

Viruses

□□□□□□□□-□□□□□EBV□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

HITES□□□□□□
□□□□□□□□□□□□DF12□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
0.005 mg/ml □□□
0.01 mg/ml □□□□
30 nM □□□□□□□□□
10 nM □□□□□□□□□□
10 nM β-□□□□□□□□
□□□□2 mM L-□□□□□□□□□4.5 mM□
5% □□□□□□□□□

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□
Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PBS □□□T25 □□□ 3-5 □□ PBS□T75 □□□ 5-10 □□□□□□ Accutase □□□□□□□T25 □□□ 1-2 □□□T75 □□□ 2.5 □□□□□□□□□□□□ 8-10 □□□□□□□□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 300xg □□ 3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DONOR

Donor age	68□
Ethnicity	□□

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

□□□