MM.1S

305304

OBECNÉ INFORMACE

Popis

Buněčná linie MM.1S je součástí série MM.1, která byla vyvinuta z jednoho pacienta s mnohočetným myelomem (MM) za účelem studia různých stadií progrese onemocnění a odpovědi na léčbu glukokortikoidy (GC). MM.1S je specificky citlivá na glukokortikoidy, jako je dexametazon, a slouží jako model pro zkoumání mechanismů apoptózy indukované GC v buňkách mnohočetného myelomu. Díky této citlivosti je MM.1S klíčovým nástrojem pro studium časných fází léčby MM a buněčných drah vedoucích k reaktivitě na GC.
Buňky MM.1S, stejně jako ostatní linie MM.1, vykazují typickou morfologii myelomu, včetně kulatých buněk s excentricky umístěnými jádry, z nichž mnohé jsou dvoujaderné nebo vícejaderné. Tyto buňky exprimují charakteristické markery plazmatických buněk, jako jsou CD38 a PCA-1, zatímco postrádají typické markery B-buněk, jako jsou CD19 a CD20, což odráží jejich terminálně diferencovaný status plazmatických buněk. Vykazují také vysokou míru exprese lehkého řetězce imunoglobulinu lambda (λ), což odpovídá jejich původu. Tato buněčná linie má zásadní význam pro zkoumání cest působení léků, rezistence a apoptózy u MM, zejména v souvislosti s léčbou GC.
Jedním z klíčových rysů MM.1S je závislost na funkčních glukokortikoidních receptorech (GR) pro reakci na léčivo. U MM.1S umožňují vysoké hladiny GR divokého typu účinně indukovat apoptózu dexametazonem, což poskytuje cenný systém pro studium molekulárních dějů, které jsou základem tohoto procesu. Tato linie je často srovnávána se svým rezistentním protějškem, MM.1R, aby bylo možné zkoumat mechanismy rezistence na GR, což je zásadní problém při léčbě MM. Buněčná linie MM.1S společně nabízí poznatky o citlivosti na léky, progresi onemocnění a potenciálních terapeutických strategiích pro mnohočetný myelom.

Tkáň	Periferní krev
Nemoc	Mnohočetný myelom

Synonyma

- MM1.S
- MM1-S
- MM-1S
- MM1S

KLASIFIKACE

Organismus	Člověk
Sex	Žena
Růstové vlastnosti	Adhezivní a suspenzní
Úroveň biologické bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKA

Morfologie	Lymfoblasty
Typ buňky	B buňka

IDENTIFIKÁTORY

Citace

MM.1S (katalogové číslo Cytion 305304)

Daňové identifikační číslo NCBI	9606

Cellosaurus	CVCL_8792

EXPRESE A NÁCHYLNOST

Mutační profil

Mutace: Gly12Ala (c.35G>C), heterozygotní; Mutace: KRAS, p.Gly12Ala (c.35G>C), heterozygotní: TRAF3, p.Val536_Asn545delValPheValAlaGlnThrValLeuGluAsninsAsp (c.1604-1630delTCTTTGTGGCCCAAACTGTTCTAGAAA), homozygotní

Produkty

IgA lambda

MANIPULACE A CHOV

Pěstovací médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilní glutamin, w: 2,0 g/l NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplňky stravy

Doplňte médium o 10 % tepelně inaktivovaného FBS

Disociační činidlo	Accutase

Subkultivace

Shromážděte suspenzi buněk do 15 ml zkumavky a jemně promyjte adherentní buňky PBS bez vápníku a hořčíku (použijte 3-5 ml pro baňky T25 a 5-10 ml pro baňky T75). Aplikujte Accutase (1-2 ml pro baňky T25, 2,5 ml pro baňky T75), abyste zajistili úplné pokrytí buněčné vrstvy. Nechte buňky inkubovat při pokojové teplotě po dobu 10 minut. Po inkubaci spojte a odstřeďte suspenzi i adherované buňky. Po odstředění opatrně resuspendujte buněčnou peletu a přeneste buněčnou suspenzi do nových baněk obsahujících čerstvé médium.

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	45 let
Etnická příslušnost	Afroameričan

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Je nutná smlouva o převodu materiálu	Yes

PODROBNOSTI O PRODUKTU

Tabulka složení