KU812

305306

GENERELL INFORMASJON

Beskrivelse

KU812-cellelinjen er en human leukemisk cellelinje som opprinnelig stammer fra en pasient med kronisk myelogen leukemi (KML) i den blastiske krisefasen. Den er kjent for sin evne til å differensiere til basofile og erytroide linjer under spesifikke forhold, noe som gjør den til et verdifullt verktøy for studier av hematopoietisk differensiering og relaterte maligniteter. Cellelinjen har egenskaper som kjennetegner basofile forløpere, blant annet tilstedeværelsen av metakromatiske granula som er positive for toluidinblått og astrablått, og den syntetiserer histamin, noe som indikerer basofil aktivitet.
KU812-celler er spesielt relevante for å undersøke komplementaktiveringsrelatert pseudoallergi (CARPA) og hypersensitivitetsreaksjoner som medieres av basofile celler. Dette skyldes deres robuste respons på komplementproteiner som C3a og C5a, som utløser frigjøring av histamin og andre inflammatoriske mediatorer, noe som etterligner pseudoallergiske reaksjoner. KU812-celler uttrykker celleoverflatemarkører som CD63 og CD203c, som er forbundet med basofil aktivering og degranulering. Disse markørene har blitt brukt i flowcytometri-baserte protokoller for å evaluere den immunologiske kompatibiliteten til nanomedisiner og andre biologiske legemidler.
I tillegg viser KU812-celler potensial for erytroid differensiering når de dyrkes under erytropoietin-supplerte forhold. Dette inkluderer spontan modning til erytroide celler som er i stand til å syntetisere ulike hemoglobiner, for eksempel voksne og føtale former. Disse egenskapene understreker nytten av KU812 i studier av erytropoiese ved siden av basofil differensiering, noe som gjør dem til en allsidig modell for hematologisk forskning.

Vev	Perifert blod
Sykdom	Kronisk myelogen leukemi, BCR-ABL1-positiv

Synonymer

- Ku812
- KU-812
- KU.812
- KU 812

KLASSIFISERING

Organisme	Menneske
Sex	Mann
Vekstegenskaper	Oppheng
Biosikkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Lymfoblastlignende
Celletype	Basofil progenitorcelle

Karyotype

Cellene inneholder minst ett Ph1-kromosom (Philadelphia).

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

KU812 (Cytion-katalognummer 305306)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_0379

UTTRYKK OG MOTTAKELIGHET

Antigenuttrykk

CD3, ANPEP (CD13)

Mutasjonsprofil

Mutasjon: TP53, p.Lys132Arg (c.395A>G), homozygot; Genfusjon: BCR-ABL, BCR-ekson 14 fusjonert med ABL1-ekson 2 (b3a2-transkript)

HÅNDTERING OG KULTUR

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikkelnummer 820700a)

Inkubasjonsatmosfære	37 °C, 5 %CO2, befuktet atmosfære.

Kosttilskudd

Suppler med 10 % FBS, tilsett 2,5 g/L glukose og 10 mM HEPES

Subkultivering

Samle suspensjonscellene i et 15 ml rør, og vask de adherente cellene forsiktig med PBS uten kalsium og magnesium (bruk 3-5 ml for T25-kolber og 5-10 ml for T75-kolber). Påfør Accutase (1-2 ml for T25-kolber, 2,5 ml for T75-kolber) og sørg for full dekning av cellelaget. La cellene inkubere i romtemperatur i 10 minutter. Etter inkubasjon kombineres og sentrifugeres både suspensjonen og de adherente cellene. Etter sentrifugering resuspenderes cellepelleten forsiktig, og cellesuspensjonen overføres til nye kolber som inneholder nytt medium.

Såtetthet	3 x 10^5 celler/ml
Væskefornyelse	2 til 3 ganger per uke

Tining og dyrking

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OG KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasma-kontaminering utelukkes ved hjelp av både PCR-baserte analyser og luminescensbaserte metoder for påvisning av mykoplasma.
For å sikre at det ikke finnes bakterie-, sopp- eller gjærkontaminering, blir cellekulturene inspisert visuelt hver dag.

Frysemedium	Som kryopreserveringsmedium bruker vi komplett vekstmedium (inkludert FBS) + 10 % DMSO for tilstrekkelig levedyktighet etter opptining, eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som inneholder optimaliserte osmobeskyttende midler og metabolske stabilisatorer for å øke utvinningen og redusere kryoindusert stress.

Oppbevaringsbetingelser

For langtidsoppbevaring plasseres hetteglassene i flytende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Lagring ved -80 °C er kun akseptabelt som et kort mellomtrinn før overføring til flytende nitrogen.

Fraktvilkår

Kryopreserverte cellelinjer sendes på tørris i validert, isolert emballasje med tilstrekkelig kjølemiddel til å opprettholde en temperatur på ca. -78 °C under hele transporten. Ved mottak skal beholderen inspiseres umiddelbart, og hetteglassene skal straks overføres til egnet lagringsplass.

DONOR

Donorens alder	38 år
Etnisitet	Japansk

JURIDISK OG SIKKERHET

Sikkerhetsregler

Når du planlegger å oppbevare et kryovial i flytende nitrogen for senere tining, er det obligatorisk å følge strenge sikkerhetstiltak. Det er viktig å bruke egnede vernehansker og -klær, og det er påbudt å bruke ansiktsmaske eller vernebriller under overføring av frosne prøver til eller fra tanken med flytende nitrogen. Dette er for å redusere risikoen for skader som følge av potensielle kryovæskeeksplosjoner ved fjerning, noe som kan føre til at skarpe fragmenter slynges ut.

Garanti

Hos Cytion står vi bak kvaliteten og levedyktigheten til produktene våre.
Vi garanterer at cellene våre vil være levedyktige ved starten av dyrkingen i 60 dager etter at de er sendt fra våre anlegg.
Vi forsikrer at alle materialer er i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i analysesertifikatet og/eller produktarket
For fullstendig informasjon, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Avtale om materialoverføring kreves	Yes

PRODUKTDETALJER

Sammensetningstabell