KU812

305306

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітинна лінія KU812 - це лейкемічні клітини людини, отримані від пацієнта з хронічною мієлогенною лейкемією (ХМЛ) у фазі бластного кризу. Вона відрізняється здатністю диференціюватися в базофільну та еритроїдну лінії за певних умов, що робить її цінним інструментом для вивчення гемопоетичної диференціації та пов'язаних з нею злоякісних новоутворень. Клітинна лінія має характеристики базофільних попередників, включаючи наявність метахроматичних гранул, які позитивно забарвлюються толуїдиновим синім і астра синім, а також синтезує гістамін, що свідчить про базофільну активність.
Клітини KU812 особливо актуальні для дослідження псевдоалергії, пов'язаної з активацією комплементу (CARPA), та реакцій гіперчутливості, опосередкованих базофілами. Це зумовлено їхньою потужною реакцією на білки комплементу, такі як C3a і C5a, які викликають вивільнення гістаміну та інших медіаторів запалення, імітуючи псевдоалергічні реакції. Клітини KU812 експресують маркери клітинної поверхні, такі як CD63 і CD203c, які пов'язані з базофільною активацією і дегрануляцією. Ці маркери використовуються в протокольній цитофлуориметрії для оцінки імунологічної сумісності нанопрепаратів та інших біологічних препаратів.
Крім того, клітини KU812 демонструють потенціал еритроїдного диференціювання при культивуванні в умовах, доповнених еритропоетином. Це включає спонтанне дозрівання в еритроїдні клітини, здатні синтезувати різні гемоглобіни, такі як дорослі та ембріональні форми. Ці особливості підкреслюють їх корисність у вивченні еритропоезу поряд з базофільною диференціацією, що робить KU812 універсальною моделлю для гематологічних досліджень.

Тканина	Периферична кров
Хвороба	Хронічна мієлогенна лейкемія, BCR-ABL1 позитивний

Синоніми

- Ku812
- KU-812
- KU.812
- KU 812

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Чоловік
Характеристики росту	Підвіска
Рівень біобезпеки	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфологія	Лімфобластоподібні
Тип клітини	Клітина-попередник базофілів

Каріотип

Клітини містять принаймні одну Ph1 (філадельфійську) хромосому.

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

KU812 (каталожний номер 305306)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_0379

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Експресія антигену

CD3, ANPEP (CD13)

Профіль мутацій

Мутація: TP53, p.Lys132Arg (c.395A>G), гомозиготний; злиття генів: BCR-ABL, екзон 14 BCR злитий з екзоном 2 ABL1 (транскрипт b3a2)

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

RPMI 1640, w: 2,0 мМ стабільний глютамін, w: 2,0 г/л NaHCO3 (номер за каталожним номером 820700a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Поповніть середовище 10% FBS, додайте 2,5 г/л глюкози та 10 мМ HEPES

Пересадка в нове середовище

Зберіть суспензію клітин у пробірку на 15 мл і обережно відмийте прилиплі клітини PBS, що не містить кальцію і магнію (використовуйте 3-5 мл для колб T25 і 5-10 мл для колб T75). Нанесіть аккутазу (1-2 мл для колб T25, 2,5 мл для колб T75), забезпечуючи повне покриття клітинного шару. Інкубуйте клітини при кімнатній температурі протягом 10 хвилин. Після інкубації об'єднайте і центрифугуйте суспензію і прилиплі клітини. Після центрифугування обережно ресуспендуйте клітинну гранулу і перенесіть клітинну суспензію в нові колби зі свіжим середовищем.

Щільність висіву	3 x 10^5 клітин/мл
Оновлення рідини	2-3 рази на тиждень

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	38 років
Етнічна приналежність	Японський

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

Таблиця складу