HCC38

305307

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

HCC38-cellelinjen er en triple-negativ brystkræftmodel (TNBC), der er kendetegnet ved sin mangel på østrogenreceptor (ER), progesteronreceptor (PR) og HER2-ekspression, hvilket gør den til et kritisk værktøj til undersøgelse af aggressive brystkræftundertyper, der ikke reagerer på hormon- eller HER2-målrettede terapier. HCC38-celler er særligt værdifulde til forskning i behandlingsresistens og de mekanismer, der driver TNBC-progression. For eksempel kan eksponering for cisplatin føre til udvikling af cisplatinresistente subkloner som HCC38CisR, der udviser øget aktivering af pro-overlevelsesveje medieret af receptortyrosinkinaser (f.eks. IGF1R og EGFR). Denne resistens kan modvirkes af målrettede behandlinger som NVP-BEZ235, en dobbelt PI3K/mTOR-hæmmer, som har vist potentiale til at genoprette cisplatin-følsomheden i HCC38CisR.
Derudover er HCC38-cellelinjen blevet undersøgt i forbindelse med apoptose og invasionsmekanismer. Knockdown af specifikke gener, såsom OC90, har vist sig at reducere cellelevedygtigheden betydeligt og øge apoptosen i HCC38, hvilket understreger den rolle, som specifikke molekylære mål spiller i celleoverlevelse og invasiv adfærd. Denne funktion er relevant for at identificere nye terapeutiske tilgange til TNBC. Desuden fremhæver HCC38's respons på behandling, herunder resistensmekanismer, dens anvendelighed til at udforske lægemiddelkombinationer, der kan omgå resistens og forbedre behandlingseffekten.
Desuden har studier med HCC38 vist, at småmolekylære hæmmere er effektive til at overvinde resistens, når de kombineres med konventionelle kemoterapeutika. For eksempel viser sambehandlingsstrategier, der involverer PI3K/mTOR-hæmmere sammen med traditionelle kemoterapimidler, at det er lovende at reducere spredningshastigheden og fremkalde apoptose i resistente cellevarianter. Sådanne resultater bidrager til udviklingen af målrettede terapier, der imødegår udfordringerne ved behandlingsresistens i TNBC.

Væv	Bryst
Sygdom	Karcinom

Synonymer

- Hcc38
- HCC-38
- HCC 38 HCC0038
- Hamon Cancer Center 38

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Kvinde
Vækstegenskaber	Tilhænger
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Epitel-lignende
Celletype	Epitelcelle

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

HCC38 (Cytion katalognummer 305307)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1267

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Proteinekspression

Epithelial glycoprotein 2 (EGP2), cytokeratin 19

Onkogener

Her2/neu-, p53+

Mutationsprofil

Mutation: TP53, p.Arg273Leu (c.818G>T), homozygot

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Dissociationsreagens	Accutase

Oddyrkning

Fjern det gamle medium fra de klæbende celler, og vask dem med PBS, der ikke indeholder calcium og magnesium. Brug 3-5 ml PBS til T25-kolber og 5-10 ml til T75-kolber. Dæk derefter cellerne helt med Accutase, brug 1-2 ml til T25-kolber og 2,5 ml til T75-kolber. Lad cellerne inkubere ved stuetemperatur i 8-10 minutter for at løsne dem. Efter inkubationen blandes cellerne forsigtigt med 10 ml medium for at resuspendere dem, og centrifugeres derefter ved 300xg i 3 minutter. Kassér supernatanten, resuspender cellerne i frisk medium, og overfør dem til nye kolber, der allerede indeholder frisk medium.

Væskeudskiftning	2 til 3 gange om ugen

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	50 år
Etnisk tilhørsforhold	Kaukasisk

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href="”/Who-we-are/Warranty/”" hreflang="”x-default”">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes