# HSC-3

305312

## OBECNÉ INFORMACE

### Popis

HSC-3 je buněčná linie lidského orálního spinocelulárního karcinomu (OSCC), která se běžně používá ke zkoumání biologie rakoviny ústní dutiny, zejména ve studiích zaměřených na apoptózu, regulaci buněčného cyklu a léčbu rakoviny. Spinocelulární karcinom dutiny ústní je nejčastějším typem rakoviny dutiny ústní a je spojen se špatnou prognózou kvůli vysokému metastatickému potenciálu a pozdnímu stadiu diagnózy. Buňky HSC-3 jsou odvozeny z primárního nádoru a jsou známy svými agresivními vlastnostmi, což z nich činí vhodný model pro testování nových protinádorových sloučenin a terapií.
Několik studií prokázalo, že buňky HSC-3 podléhají apoptóze a autofagii v reakci na přírodní sloučeniny a protinádorové látky. Například bylo zjištěno, že piperin, alkaloid z černého pepře, snižuje životaschopnost buněk a vyvolává apoptózu v závislosti na dávce. U buněk HSC-3, kterým byl podáván piperin, byla pozorována apoptotická tělíska, fragmentace DNA a zvýšená exprese proapoptotických proteinů, jako je Bax. Kromě toho se ukázalo, že piperin aktivuje apoptózu i autofagii prostřednictvím inhibice signální dráhy PI3K/Akt/mTOR, která je rozhodující pro proliferaci a přežití nádorových buněk. Podobně bylo prokázáno, že i další sloučeniny, jako berberin a geniposid, indukují apoptózu narušením mitochondriálního membránového potenciálu a aktivací kaspázových drah.
Využitelnost buněk HSC-3 se rozšiřuje i na studie in vivo, kde jejich použití v myších xenograftových modelech prokázalo inhibici růstu nádorů při léčbě přírodními sloučeninami, jako je piperin. Tyto buňky slouží jako spolehlivá platforma pro hodnocení účinnosti tradičních i nových způsobů léčby rakoviny.

| | |
|---|---|
| **Tkáň** | Jazyk |
| **Nemoc** | Dlaždicobuněčný karcinom |
| **Místo metastázy** | Krční lymfatická uzlina |

### Synonyma

- HSC 3
- HSC3

## KLASIFIKACE

| | |
|---|---|
| **Organismus** | Člověk |
| **Sex** | Muž |
| **Růstové vlastnosti** | Přívrženec |
| **Úroveň biologické bezpečnosti** | 1 |

## IDENTIFIKÁTORY

### Citace

HSC-3 (katalogové číslo Cytion 305312)

| | |
|---|---|
| **Daňové identifikační číslo NCBI** | 9606 |
| **Cellosaurus** | CVCL_1288 |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## EXPRESE A NÁCHYLNOST

### Mutační profil

Mutace: (c.358G>T), homozygotní; Mutace: CDKN2A, p.Glu120Ter (c.358G>T): PIK3CA, p.Glu545Gly (c.1634A>G); mutace: PIK3CA, p.Glu545Gly (c.1634A>G), homozygotní: TERT, c.1-124C>T (c.228C>T); mutace: p.1-124C>T (c.228C>T): TP53, p.Lys305fs (c.912_913insTAAG)

## MANIPULACE A CHOV

### Pěstovací médium

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamin, w: 2,2 g/l NaHCO3, w: EBSS (číslo článku Cytion 820100a)

| | |
|---|---|
| **Inkubační atmosféra** | 37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra. |

### Doplňky stravy

Doplňte médium o 10 % FBS a 1 % NEAA

| | |
|---|---|
| **Disociační činidlo** | Accutase |

### Subkultivace

Odstraňte staré médium z adherovaných buněk a promyjte je PBS bez vápníku a hořčíku. Pro baňky T25 použijte 3-5 ml PBS a pro baňky T75 5-10 ml. Poté buňky zcela zakryjte přípravkem Accutase, přičemž použijte 1-2 ml pro baňky T25 a 2,5 ml pro baňky T75. Nechte buňky inkubovat při pokojové teplotě po dobu 8-10 minut, aby se oddělily. Po inkubaci jemně promíchejte buňky s 10 ml média, aby byly znovu suspendovány, a poté je odstřeďte při 300xg po dobu 3 minut. Supernatant vyhoďte, buňky znovu rozpusťte v čerstvém médiu a přeneste je do nových baněk, které již obsahují čerstvé médium.

### Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

### Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

| | |
|---|---|
| **Mrazicí médium** | Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo. |

### Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

**Dopravní podmínky**

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

## DÁRCE

| | |
|---|---|
| **Věk dárce** | 64 let |
| **Etnická příslušnost** | Japonský |

## PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**Bezpečnostní opatření**

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

**Záruka**

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

| | |
|---|---|
| **Je nutná smlouva o převodu materiálu** | Yes |