AU565

305313

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

Az AU565 sejtvonal emberi emlőrákból származik, és HER2-pozitívnak minősül, így értékes modell a HER2-ellenes terápiák, például a trastuzumab (TZM) tanulmányozására. Ezeket a sejteket széles körben használják az emlőrák viselkedésének vizsgálatára, különösen a célzott gyógyszeradagolás és az áttétképződési folyamatok tekintetében. Az AU565 sejtek felhasználásával végzett kutatások kimutatták, hogy jelentős HER2-expressziót mutatnak a plazmamembránon, ami megkönnyíti az anti-HER2 monoklonális antitestek, például a TZM kötődési hatékonyságának és internalizációjának vizsgálatát. Az AU565 sejtek hatékony TZM-kötődést mutatnak a membránon, majd ezt követően felhalmozódnak az intracelluláris kompartmentekben, betekintést nyújtva a TZM tumorsejteken belüli felvételében és megtartásában szerepet játszó endocitikus és trafikációs mechanizmusokba. Ez az egyedi viselkedés az AU565-öt más HER2-pozitív sejtvonalakhoz képest megkülönböztető modellé teszi, és támogatja a gyógyszerhatás és a sejtmembrán dinamikájának vizsgálatára való felhasználását.
Az AU565 sejtek modellként szolgálnak az áttétképző viselkedés tanulmányozására is, különösen a transzendotheliális migrációra, amely a rákos áttétképzés egyik kritikus lépése. Gyengén invazív sejtvonalként az AU565-nek az endotélsejt-rétegeken keresztüli migrációs képessége nagymértékben függ a fókuszos adhéziós kináz (FAK) jelátviteltől, amely megkönnyíti a migráció során az extracelluláris mátrixszal és az endotélsejtekkel való kölcsönhatásokat. Az AU565 sejtek FAK-aktivitásának gátlása bizonyítottan csökkenti a migrációs sebességüket, ami rávilágít a FAK sejtmozgásban betöltött szerepére, és azt sugallja, hogy terápiás célpont lehet a metasztatikus progresszió korlátozására. Emellett az AU565 sejtek a tumor mikrokörnyezetében lévő eltérésekre, például a kollagénsűrűség különbségeire is reagálnak, ami hatással lehet a gyógyszeradagolás hatékonyságára és rezisztenciájára. Ezek a tulajdonságok az AU565 sejteket hatékony modellé teszik a HER2 célzott terápiák és a tumor mikrokörnyezetének a kezelés eredményére gyakorolt hatásának tanulmányozására.

Szövet	Mell
Betegség	Adenokarcinóma
Áttétes hely	Mellhártya folyadékgyülem

Szinonimák

- AU-565
- AU 565

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Nő
Növekedési tulajdonságok	Hűséges
Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Morfológia	Epithelszerű

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

AU565 (Cytion katalógusszám: 305313)

NCBI adóazonosító szám	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_1074

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Kifejeződő receptorok

Epidermális növekedési faktor (EGF)

Onkogének

Her2/neu+ (túlexpresszált), her3+, her4+, p53+

Mutációs profil

Mutáció: TP53, p.Arg175His (c.524G>A), homozigóta

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion 820700a cikkszám)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A táptalajt egészítsük ki 10% FBS-szel

Diszociációs reagens	Accutase

Átültetés

Távolítsa el a régi táptalajt a megtapadt sejtekről, és mossa őket kalcium- és magnéziummentes PBS-szel. T25-ös lombikokhoz 3-5 ml PBS-t, T75-ös lombikokhoz pedig 5-10 ml-t használjunk. Ezután fedjük be a sejteket teljesen Accutase-zal, T25 lombikok esetében 1-2 ml-t, T75 lombikok esetében 2,5 ml-t használva. A sejteket 8-10 percig hagyjuk szobahőmérsékleten inkubálni, hogy leváljanak. Az inkubálás után óvatosan keverjük össze a sejteket 10 ml tápfolyadékkal, hogy reszuszpendáljuk őket, majd centrifugáljuk 300xg-nél 3 percig. Dobja el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket friss tápfolyadékban, és helyezze át őket új lombikokba, amelyek már friss tápfolyadékot tartalmaznak.

Folyadékcsere	hetente 1-2 alkalommal

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	43 év
Etnikai hovatartozás	Kaukázusi

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes

TERMÉKADATOK

Összetételi táblázat