AU565

305313

GENEL BILGILER

Açıklama

AU565 hücre hattı bir insan meme karsinomundan türetilmiştir ve HER2-pozitif olarak sınıflandırılmıştır, bu da onu trastuzumab (TZM) gibi HER2-hedefli tedavileri incelemek için değerli bir model haline getirmektedir. Bu hücreler, özellikle hedefe yönelik ilaç dağıtımı ve metastatik süreçlerle ilgili olarak meme kanseri davranışlarını araştırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. AU565 hücrelerini kullanan araştırmalar, plazma membranında önemli HER2 ekspresyonu sergilediklerini ve TZM gibi anti-HER2 monoklonal antikorların bağlanma etkinliği ve içselleştirilmesi üzerine çalışmaları kolaylaştırdıklarını göstermiştir. AU565 hücreleri membranda etkili TZM bağlanması ve ardından hücre içi bölmelerde birikim sergileyerek, TZM'nin tümör hücreleri içinde alınması ve tutulmasında rol oynayan endositik ve kaçakçılık mekanizmaları hakkında bilgi sağlar. Bu benzersiz davranış, AU565'i diğer HER2-pozitif hücre hatlarına kıyasla farklı bir model haline getirmekte ve ilaç etkinliği ile hücre zarı dinamiklerinin araştırılmasında kullanımını desteklemektedir.
AU565 hücreleri ayrıca metastatik davranışı, özellikle de kanser metastazında kritik bir adım olan transendotelyal göçü incelemek için bir model görevi görür. Zayıf invaziv bir hücre hattı olan AU565'in endotel hücre katmanları boyunca göç etme yeteneği, göç sırasında hücre dışı matris ve endotel hücreleri ile etkileşimleri kolaylaştıran fokal adezyon kinaz (FAK) sinyaline büyük ölçüde bağlıdır. AU565 hücrelerinde FAK aktivitesinin inhibe edilmesinin göç oranlarını azalttığı gösterilmiştir, bu da FAK'ın hücre hareketliliğindeki rolünü vurgulamakta ve metastatik ilerlemeyi sınırlamak için terapötik bir hedef olarak potansiyelini ortaya koymaktadır. Ek olarak, AU565 hücreleri, kolajen yoğunluğundaki farklılıklar gibi tümör mikroçevresindeki varyasyonlara yanıtlar sergiler ve bu da ilaç dağıtım etkinliğini ve direncini etkileyebilir. Bu özellikler, AU565 hücrelerini HER2 hedefli tedavileri ve tümör mikroçevresinin tedavi sonuçları üzerindeki etkilerini incelemek için güçlü bir model haline getirmektedir.

Doku	Meme
Hastalık	Adenokarsinom
Metastaz yeri	Plevral efüzyon

Eş anlamlılar

- AU-565
- AU 565

SINIFLANDIRMA

Canlı	İnsan
Cinsiyet	Kadın
Büyüme özellikleri	Bağlı
Biyogüvenlik seviyesi	1

ÖZELLIKLER

Morfoloji	Epitel benzeri

TANIMLAYICILAR

Kaynak gösterimi

AU565 (Cytion katalog numarası 305313)

NCBI Vergi Kimlik Numarası	9606
Cellosaurus	CVCL_1074

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

İFADE VE DUYARLILIK

Eksprese edilen reseptörler

Epidermal büyüme faktörü (EGF)

Onkogenler

Her2/neu+ (aşırı eksprese), her3+, her4+, p53+

Mutasyon profili

Mutasyon: TP53, p.Arg175His (c.524G>A), homozigot

İŞLEME VE YETIŞTIRME

Besiyeri

RPMI 1640, w: 2.0 mM stabil Glutamin, w: 2.0 g/L NaHCO3 (Cytion makale numarası 820700a)

Kuluçka ortamı	37°C, %5CO2, nemlendirilmiş atmosfer.

Takviyeler

Ortamı %10 FBS ile takviye edin

Ayrıştırma reaktifi	Accutase

Alt kültür oluşturma

Yapışık hücrelerden eski ortamı çıkarın ve kalsiyum ve magnezyum içermeyen PBS ile yıkayın. T25 şişeleri için 3-5 ml PBS ve T75 şişeleri için 5-10 ml kullanın. Ardından, T25 flasklar için 1-2 ml ve T75 flasklar için 2,5 ml kullanarak hücreleri Accutase ile tamamen kaplayın. Hücreleri ayırmak için oda sıcaklığında 8-10 dakika inkübasyona bırakın. İnkübasyondan sonra, hücreleri yeniden süspanse etmek için 10 ml besiyeriyle hafifçe karıştırın, ardından 300xg'de 3 dakika santrifüjleyin. Süpernatantı atın, hücreleri taze besiyerinde yeniden süspanse edin ve zaten taze besiyeri içeren yeni şişelere aktarın.

Sıvı değişimi	haftada 1 ila 2 kez

Çözme ve kültürleme

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KALITE KONTROL VE KRIYOPREZERVASYON

Kısırlık

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır. Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.

Dondurma ortamı	Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

Saklama koşulları

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

Nakliye koşulları

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

BAĞIŞÇI

Bağışçının yaşı	43 yıl
Etnik köken	Kafkas

YASAL VE GÜVENLIK

Güvenlik önlemleri

İleride çözdürmek üzere sıvı nitrojen içinde bir kriyoviyal saklamayı planlarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak zorunludur. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler şarttır ve dondurulmuş numunelerin sıvı nitrojen tankına veya tanktan transferi sırasında yüz maskesi veya koruyucu gözlük kullanılması gerekir. Bu, çıkarma sırasında keskin parçaların fırlamasına neden olabilecek potansiyel kriyoviyal patlamalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak içindir.

Garanti

Cytion olarak ürünlerimizin kalitesinin ve canlılığının arkasındayız.
Hücrelerimizin, tesislerimizden sevkiyattan sonra 60 gün boyunca kültürün başlangıcında canlı olacağını garanti ediyoruz.
Tüm malzemelerin Analiz Sertifikası ve/veya Ürün Sayfasında açıklanan özelliklere uygun olduğunu garanti ediyoruz
Tüm ayrıntılar için lütfen <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garanti Beyanımıza bakın

Malzeme Transfer Anlaşması gereklidir	Yes

ÜRÜN DETAYLARI

Bileşim tablosu