FTC-133

305349

INFORMACIÓN GENERAL

Descripción

FTC-133 es una línea celular humana de carcinoma folicular de tiroides derivada de una metástasis en un ganglio linfático. Se utiliza ampliamente para investigar los mecanismos subyacentes a la progresión del cáncer de tiroides, la resistencia a las terapias y los cambios en la expresión génica asociados a la biología tumoral. Esta línea celular se ha empleado para estudiar las respuestas al tratamiento en modelos de cáncer de tiroides diferenciado (CTD), especialmente las relacionadas con la resistencia a los fármacos y las vías de apoptosis. La investigación con FTC-133 ha revelado su sensibilidad a varios inhibidores dirigidos a las vías de respuesta al daño del ADN, como el inhibidor de ATR BAY 1895344, que puede detener el crecimiento, inducir la apoptosis y mejorar los resultados terapéuticos cuando se combina con inhibidores de tirosina quinasa.
Las células FTC-133 también han sido importantes para comprender los mecanismos de resistencia a múltiples fármacos. Por ejemplo, esta línea celular muestra resistencia a la doxorrubicina, asociada a la sobreexpresión de la glicoproteína P (P-gp) y a interacciones con el receptor CD47. Estos factores contribuyen a reducir la captación del fármaco y a disminuir la apoptosis a través de vías que implican a la cascada de señalización JNK. Se ha estudiado la modulación de estos mecanismos de resistencia mediante la inhibición de la P-gp, que restablece la sensibilidad a la doxorrubicina. Estos hallazgos subrayan el papel del FTC-133 en la exploración de terapias dirigidas y vías de resistencia, informando el desarrollo de regímenes de tratamiento más eficaces para los cánceres de tiroides.

Pañuelo de papel	Glándula tiroides
Enfermedad	Carcinoma folicular de la glándula tiroides

Sinónimos

- FTC133

CLASIFICACIÓN

Organismo	Humano
Sexo	Hombre
Propiedades de crecimiento	Adherente
Nivel de bioseguridad	1

CARACTERÍSTICAS

Morfología	Polimórfico
Tipo de célula	Células endoteliales

IDENTIFICADORES

Referencia

FTC-133 (número de catálogo 305349 de Cytion)

N.º de identificación fiscal del NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1219

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD

Expresión de proteínas

Expresión de 5' - Deiodinasa Tipo I

Perfil mutacional

Mutación: FLCN, p.His429Thrfs*39 (c.1285delC), homocigoto Mutación: MSH6, p.Lys1045fs (c.3135delG), homocigoto Mutación: NF1, p.Cys167Ter (c.501T>A), homocigoto Mutación: PTEN, p.Arg130Ter (c.388C>T), homocigoto Mutación: TERT, c.1-124C>T (c.228C>T) (C228T), homocigoto Mutación: TP53, p.Arg273His (c.818G>A), homocigoto

MANEJO Y CULTIVO

Medio de cultivo

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L de glucosa, w: 2,5 mM de L-glutamina, w: 15 mM de HEPES, w: 0,5 mM de piruvato sódico, w: 1,2 g/L de NaHCO3 (número de artículo de Cytion 820400a)

Atmósfera de incubación	37°C, 5%CO2, atmósfera humidificada.

Suplementos

Complementar el medio con un 10% de FBS

Reactivo de disociación	Accutase

Subcultivo

Retire el medio antiguo de las células adheridas y lávelas con PBS que carezca de calcio y magnesio. Para matraces T25, utilice 3-5 ml de PBS, y para matraces T75, utilice 5-10 ml. A continuación, cubra completamente las células con Accutase, utilizando 1-2 ml para matraces T25 y 2,5 ml para matraces T75. Deje incubar las células a temperatura ambiente durante 8-10 minutos para desprenderlas. Tras la incubación, mezclar suavemente las células con 10 ml de medio para resuspenderlas y, a continuación, centrifugar a 300xg durante 3 minutos. Desechar el sobrenadante, resuspender las células en medio fresco y transferirlas a nuevos matraces que ya contengan medio fresco.

Densidad de siembra	1 - 5 x 10^4 células/cm^2

Descongelación y cultivo

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROL DE CALIDAD Y CRIOPRESERVACIÓN

Esterilidad

La contaminación por micoplasma se excluye utilizando tanto ensayos basados en la PCR como métodos de detección de micoplasma basados en la luminiscencia.
Para garantizar la ausencia de contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

Medio de congelación	Como medio de criopreservación, utilizamos el medio de crecimiento completo (incluido FBS) + 10% DMSO para una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo 800100 de Cytion), que incluye osmoprotectores optimizados y estabilizadores metabólicos para mejorar la recuperación y reducir el estrés crioinducido.

Condiciones de almacenamiento

Para la conservación a largo plazo, colocar los viales en nitrógeno líquido en fase vapor a una temperatura aproximada de -150 a -196 °C. El almacenamiento a -80 °C sólo es aceptable como breve paso intermedio antes de la transferencia al nitrógeno líquido.

Condiciones de envío

Las líneas celulares crioconservadas se envían en hielo seco en envases validados y aislados con suficiente refrigerante para mantener aproximadamente -78 °C durante el tránsito. A la recepción, inspeccione el envase inmediatamente y transfiera los viales sin demora al almacenamiento adecuado.

DONANTE

Edad del donante	42 años
Origen étnico	Caucásico

ASPECTOS LEGALES Y DE SEGURIDAD

Medidas de seguridad

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su futura descongelación, es obligatorio cumplir estrictas medidas de seguridad. Es esencial utilizar guantes y ropa de protección adecuados, así como una mascarilla o gafas de seguridad durante el traslado de muestras congeladas desde o hacia el tanque de nitrógeno líquido. Con ello se pretende mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones crioviales al extraerlas, que pueden dar lugar a la proyección de fragmentos afilados.

Garantía

En Cytion, respaldamos la calidad y viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante los 60 días posteriores al envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales se ajustan a las especificaciones descritas en el Certificado de Análisis y/o Hoja de Producto
Para más información, consulte nuestra <a href=""/Quiénes somos/Garantía/"" hreflang=""x-default"">Declaración de garantía

Se requiere un acuerdo de transferencia de material	Yes