OVCAR-8

305383

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

OVCAR-8 on ihmisen munasarjasyöpäsolulinja, joka on peräisin potilaasta, jolla on pitkälle edennyt munasarjojen adenokarsinooma. Tämä solulinja on tunnettu erityisesti siitä, että se on erittäin vastustuskykyinen sisplatiinille ja karboplatiinille, joita annettiin suurina annoksina potilaan hoidon aikana. OVCAR-8-solulinjaa hyödynnetään laajalti tutkimuksessa, jossa tutkitaan munasarjasyövän kemoresistenssimekanismeja sekä kehitetään strategioita platinapohjaisten kemoterapioiden resistenssin voittamiseksi.
OVCAR-8-soluilla on epiteelimorfologia, ja ne kasvavat tarttuvasti viljelyssä. Solulinjalle on ominaista korkea-asteisiin munasarjasyöviin liittyvät molekyyli- ja fenotyyppiset piirteet, mukaan lukien muutokset DNA-vaurioiden korjausmekanismeissa ja muissa reiteissä, jotka edistävät kasvaimen selviytymistä kemoterapeuttisessa stressissä. Toisin kuin joissakin muissa munasarjasyövän solulinjoissa, OVCAR-8:ssa ei ole havaittavissa metallotioneinin ilmentymistä, joka on proteiini, jolla uskotaan olevan merkitystä resistenssissä raskasmetallipohjaisille lääkkeille. Tämä solulinja osoittaa kuitenkin ristiresistenssiä kadmiumille ja muille aineille, mikä viittaa vaihtoehtoisten resistenssimekanismien, kuten lisääntyneiden glutationitasojen ja parantuneen DNA:n korjauskyvyn, käyttöön.
OVCAR-8 on arvokas väline prekliinisessä tutkimuksessa kemoterapeuttisten aineiden seulonnassa, kohdennettujen hoitojen arvioinnissa ja kemoresistenssin biologian tutkimuksessa. Tutkijat käyttävät tätä solulinjaa tutkiessaan lääkeyhdistelmiä, joiden tarkoituksena on herkistää resistenttejä kasvaimia tavanomaisille hoidoille. Lisäksi OVCAR-8 tarjoaa tietoa munasarjasyöpäsolujen geneettisistä ja molekulaarisista mukautuksista, jotka ovat niiden selviytymisen ja pysyvyyden taustalla aggressiivisista kemoterapiaohjelmista huolimatta. Sen kliininen merkitys ja resistenssiprofiili tekevät siitä tärkeän resurssin munasarjasyövän tutkimuksen ja hoidon kehittämisen edistämiseksi.

Kudos	Munasarja
Sairaus	Munasarjojen adenokarsinooma

Synonyymit

- OVCAR 8
- NIH:OVCAR-8
- OVCAR8
- Ovcar8
- OVCAR.8
- OVCA8
- OVCAR-8/EGFP_LC3

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Nainen
Kasvuominaisuudet	Kiinnittynyt
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Epiteelin kaltainen
Kaksinkertaistumisaika	24-32 tuntia

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

TUNNISTEET

Lähdeviite

OVCAR-8 (Cytionin luettelonumero 305383)

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_1629

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Mutaatioprofiili

Mutaatio: CTNNB1, yksinkertainen, p.Gln26Arg (c.77A>G), heterotsygoottinen; Mutaatio: CTNNB1, yksinkertainen, p.Gln26Arg (c.77A>G), heterotsygoottinen: ERBB2, Simple, p.Gly776Val (c.2327G>T), Heterozygous; Mutation: KRAS, yksinkertainen, p.Pro121His (c.362C>A), heterotsygoottinen; Mutaatio: KRAS, yksinkertainen, p.Pro121His (c.362C>A), heterotsygoottinen; Mutaatio: KRAS, yksinkertainen, p.Pro121His (c.362C>A), heterotsygoottinen: TP53, yksinkertainen, c.376-1G>A (p.Tyr126_Lys132del, c.376_396del21), homotsygoottinen, liitosakseptorimutaatio

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

RPMI 1640, w: 2,1 mM stabiilia glutamiinia, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Cytionin artikkelinumero 820700a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO_2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 %:lla FBS:llä

Dissosiaatioreagenssi	Accutase
Kylvötiheys	3–4 x 10^4 solua/ml

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	64 vuotta
Etnisyys	Kaukasialainen

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes