OVCAR-8

305383

BENDRA INFORMACIJA

Aprašymas

OVCAR-8 yra žmogaus kiaušidžių karcinomos ląstelių linija, sukurta iš pacientės, sergančios pažengusios stadijos kiaušidžių adenokarcinoma. Ši ląstelių linija ypač pasižymi dideliu atsparumu cisplatinai ir karboplatinai, kurios paciento gydymo metu buvo skiriamos didelėmis dozėmis. OVCAR-8 plačiai naudojama atliekant tyrimus, kuriais tiriami kiaušidžių vėžio chemorezistentiškumo mechanizmai, taip pat kuriant strategijas, kaip įveikti atsparumą chemoterapijai platinos pagrindu.
OVCAR-8 ląstelės pasižymi epitelio morfologija ir kultūroje auga adherentiškai. Šiai ląstelių linijai būdingi molekuliniai ir fenotipiniai požymiai, susiję su aukšto laipsnio kiaušidžių vėžiu, įskaitant DNR pažaidų taisymo mechanizmų ir kitų takų, padedančių navikui išgyventi veikiant chemoterapiniam stresui, pokyčius. Skirtingai nuo kai kurių kitų kiaušidžių vėžio ląstelių linijų, OVCAR-8 neaptinkama metaltioneino - baltymo, kuris, kaip manoma, turi įtakos atsparumui sunkiųjų metalų pagrindu pagamintiems vaistams - raiška. Tačiau ši ląstelių linija pasižymi kryžminiu atsparumu kadmiui ir kitoms medžiagoms, o tai rodo, kad joje veikia alternatyvūs atsparumo mechanizmai, pavyzdžiui, padidėjęs glutationo kiekis ir padidėjęs DNR atstatymo gebėjimas.
OVCAR-8 yra vertinga ikiklinikinių tyrimų priemonė chemoterapinių medžiagų atrankai, tikslinių gydymo būdų vertinimui ir chemorezistentiškumo biologijos tyrimams. Mokslininkai šią ląstelių liniją naudoja vaistų deriniams, skirtiems jautrinti standartiniam gydymui atsparius navikus, tirti. Be to, OVCAR-8 leidžia suprasti genetines ir molekulines kiaušidžių vėžio ląstelių adaptacijas, kurios lemia jų išgyvenamumą ir išlikimą nepaisant agresyvių chemoterapijos režimų. Dėl savo klinikinės svarbos ir atsparumo profilio ji yra svarbus šaltinis, padedantis plėtoti kiaušidžių vėžio mokslinius tyrimus ir terapijos kūrimą.

Audinys	Kiaušidės
Liga	Kiaušidžių adenokarcinoma

Sinonimai

- OVCAR 8
- NIH:OVCAR-8
- OVCAR8
- Ovcar8
- OVCAR.8
- OVCA8
- OVCAR-8/EGFP_LC3

KLASIFIKACIJA

Organizmas	Žmogus
Seksas	Moteris
Augimo savybės	Prisijungęs
Biologinio saugumo lygis	1

CHARAKTERISTIKOS

Morfologija	Į epitelį panašus
Laikas, per kurį skaičius padvigubėja	24-32 valandos

IDENTIFIKATORIAI

Nuoroda

OVCAR-8 (Cytion katalogo numeris 305383)

NCBI mokesčių identifikavimo kodas	9606
Cellosaurus	CVCL_1629

IŠRAIŠKA IR JAUTRUMAS

Mutacijų profilis

Mutacija: Gln26Arg (c.77A>G), heterozigotinė; mutacija: CTNNB1, paprasta, p.Gln26Arg (c.77A>G), heterozigotinė; mutacija: ERBB2, paprasta, p.Gly776Val (c.2327G>T), heterozigotinė; mutacija: KRAS, paprasta, p.Pro121His (c.362C>A), heterozigotinė; mutacija: KRAS, paprasta, p.Pro121His (c.362C>A), heterozigotinė; mutacija: TP53, paprasta, c.376-1G>A (p.Tyr126_Lys132del, c.376_396del21), homozigotinė, splaisingo akceptoriaus mutacija

LAIKYMAS IR AUGINIMAS

Maitinamoji terpė

RPMI 1640, š: 2,1 mM stabilus glutaminas, š: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion gaminio numeris 820700a)

Inkubacijos aplinka	37 °C, 5 %CO2, drėkintoje atmosferoje.

Maisto papildai

Papildykite terpę 10 % FBS

Disociacijos reagentas	Accutase
Sėjos tankis	3–4 x 10^4 ląstelės/ml

Atšildymas ir auginimas

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KOKYBĖS KONTROLĖ IR KRIOKONSERVAVIMAS

Sterilumas

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.

Šaldymo terpė	Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas.

Laikymo sąlygos

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystąjį azotą.

Pristatymo sąlygos

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78 °C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelkite mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

DONORAS

Donoro amžius	64 metai
Etninė priklausomybė	Kaukaziečių

TEISINIAI IR SAUGOS KLAUSIMAI

Saugos priemonės

Planuojant saugoti kriovaistinę skystame azote, kad ateityje ją būtų galima atšildyti, būtina laikytis griežtų saugos priemonių. Būtina mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, o perkeliant užšaldytus mėginius į skystojo azoto talpyklą arba iš jos būtina naudoti veido kaukę arba apsauginius akinius. Taip siekiama sumažinti sužeidimų riziką dėl galimo kriokomponentų sprogimo išėmimo metu, kai gali išsiveržti aštrūs fragmentai.

Garantija

" Cytion" garantuoja savo produktų kokybę ir gyvybingumą.
Garantuojame, kad mūsų ląstelės bus gyvybingos kultūrų auginimo pradžioje 60 dienų po išsiuntimo iš mūsų gamyklos.
Užtikriname, kad visos medžiagos atitinka analizės sertifikate ir (arba) gaminio lape aprašytas specifikacijas
Išsamią informaciją rasite mūsų <a href=""/Kas mes esame/garantijos/" hreflang=""x-default"">Garantijos pareiškime

Reikalinga medžiagų perdavimo sutartis	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB