OVCAR-8

305383

INFORMACJE OGÓLNE

Opis

OVCAR-8 to ludzka linia komórkowa raka jajnika utworzona od pacjentki z gruczolakorakiem jajnika w zaawansowanym stadium. Ta linia komórkowa jest szczególnie znana ze swojej znacznej oporności na cisplatynę i karboplatynę, które były podawane w wysokich dawkach podczas leczenia pacjentki. OVCAR-8 jest szeroko wykorzystywana w badaniach nad mechanizmami chemiooporności w raku jajnika, a także w opracowywaniu strategii przezwyciężania oporności na chemioterapeutyki na bazie platyny.
Komórki OVCAR-8 wykazują morfologię nabłonkową i rosną adherentnie w hodowli. Linia komórkowa charakteryzuje się cechami molekularnymi i fenotypowymi związanymi z rakiem jajnika o wysokim stopniu złośliwości, w tym zmianami w mechanizmach naprawy uszkodzeń DNA i innych szlakach przyczyniających się do przeżycia guza pod wpływem stresu chemioterapeutycznego. W przeciwieństwie do niektórych innych linii komórkowych raka jajnika, OVCAR-8 nie wykazuje wykrywalnej ekspresji metalotioneiny, białka uważanego za odgrywające rolę w oporności na leki na bazie metali ciężkich. Jednak ta linia komórkowa wykazuje odporność krzyżową na kadm i inne czynniki, co sugeruje zaangażowanie alternatywnych mechanizmów oporności, takich jak zwiększony poziom glutationu i zwiększona zdolność naprawy DNA.
OVCAR-8 jest cennym narzędziem w badaniach przedklinicznych do badań przesiewowych środków chemioterapeutycznych, oceny terapii celowanych i badania biologii chemiooporności. Naukowcy wykorzystują tę linię komórkową do badania kombinacji leków zaprojektowanych w celu uwrażliwienia opornych nowotworów na standardowe terapie. Ponadto OVCAR-8 zapewnia wgląd w genetyczne i molekularne adaptacje komórek raka jajnika, które leżą u podstaw ich przetrwania i utrzymywania się pomimo agresywnych schematów chemioterapii. Jego znaczenie kliniczne i profil oporności sprawiają, że jest on ważnym zasobem dla rozwoju badań nad rakiem jajnika i rozwoju terapii.

Chusteczka	Jajnik
Choroba	Gruczolakorak jajnika

Synonimy

- OVCAR 8
- NIH:OVCAR-8
- OVCAR8
- Ovcar8
- OVCAR.8
- OVCA8
- OVCAR-8/EGFP_LC3

KLASYFIKACJA

Organizm	Człowiek
Seks	Kobieta
Właściwości związane ze wzrostem	Zwolennik
Poziom bezpieczeństwa biologicznego	1

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Morfologia	Podobny do nabłonka
Czas podwojenia	24-32 godziny

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTYFIKATORY

Źródło

OVCAR-8 (numer katalogowy Cytion 305383)

Numer identyfikacji podatkowej NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1629

EKSPRESJA I PODATNOŚĆ

Profil mutacji

Mutacja: CTNNB1, Simple, p.Gln26Arg (c.77A>G), heterozygotyczna; Mutacja: ERBB2, Simple, p.Gly776Val (c.2327G>T), heterozygotyczna; Mutacja: KRAS, Simple, p.Pro121His (c.362C>A), heterozygotyczny; Mutacja: TP53, Simple, c.376-1G>A (p.Tyr126_Lys132del, c.376_396del21), Homozygotyczny, Mutacja akceptora splicingu

POSTĘPOWANIE I HODOWLA

Pożywka hodowlana

RPMI 1640, w: 2,1 mM stabilnej glutaminy, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (numer artykułu Cytion 820700a)

Atmosfera inkubacyjna	37°C, 5%CO_2, nawilżona atmosfera.

Suplementy

Uzupełnić podłoże 10% FBS

Odczynnik dysocjacyjny	Accutase
Gęstość wysiewu	3–4 x 10^4 komórek/ml

Rozmrażanie i hodowla

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA JAKOŚCI I KRIOKONSERWACJA

Bezpłodność

Zanieczyszczenie mykoplazmą jest wykluczane przy użyciu zarówno testów opartych na PCR, jak i metod wykrywania mykoplazmy opartych na luminescencji.
Aby upewnić się, że nie ma zanieczyszczenia bakteriami, grzybami lub drożdżami, hodowle komórkowe są poddawane codziennym kontrolom wizualnym.

Pożywka do zamrażania	Jako pożywki do kriokonserwacji używamy kompletnej pożywki wzrostowej (w tym FBS) + 10% DMSO w celu zapewnienia odpowiedniej żywotności po rozmrożeniu lub CM-1 (numer katalogowy Cytion 800100), która zawiera zoptymalizowane osmoprotektanty i stabilizatory metaboliczne w celu zwiększenia regeneracji i zmniejszenia stresu wywołanego kriokonserwacją.

Warunki przechowywania

W celu długotrwałego przechowywania należy umieścić fiolki w ciekłym azocie w fazie lotnej w temperaturze od -150 do -196 °C. Przechowywanie w temperaturze -80 °C jest dopuszczalne tylko jako krótki etap przejściowy przed przeniesieniem do ciekłego azotu.

Warunki wysyłki

Linie komórkowe poddane kriokonserwacji są wysyłane w suchym lodzie w zatwierdzonych, izolowanych opakowaniach z wystarczającą ilością czynnika chłodniczego, aby utrzymać temperaturę około -78°C przez cały czas transportu. Po otrzymaniu przesyłki należy natychmiast sprawdzić pojemnik i bezzwłocznie przenieść fiolki do odpowiedniego miejsca przechowywania.

DARCZYŃCA

Wiek dawcy	64 lata
Pochodzenie etniczne	Kaukaski

KWESTIE PRAWNE I BEZPIECZEŃSTWO

Środki bezpieczeństwa

Planując przechowywanie kriofiolek w ciekłym azocie w celu ich późniejszego rozmrożenia, należy bezwzględnie przestrzegać rygorystycznych środków bezpieczeństwa. Niezbędne są odpowiednie rękawice i odzież ochronna, a podczas przenoszenia zamrożonych próbek do lub ze zbiornika z ciekłym azotem wymagane jest stosowanie maski lub okularów ochronnych. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka obrażeń spowodowanych potencjalnymi eksplozjami kriowialu podczas wyjmowania, które mogą skutkować wyrzuceniem ostrych fragmentów.

Gwarancja

W Cytion gwarantujemy jakość i żywotność naszych produktów.
Gwarantujemy, że nasze komórki będą żywotne na początku hodowli przez 60 dni po wysyłce z naszych zakładów.
Zapewniamy, że wszystkie materiały są zgodne ze specyfikacjami opisanymi w certyfikacie analizy i/lub karcie produktu
Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Oświadczeniu gwarancyjnym

Wymagana umowa o transferze materiałów	Yes