OVCAR-8

305383

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

OVCAR-8 är en human cellinje för äggstockscancer som etablerats från en patient med avancerat stadium av adenokarcinom i äggstockarna. Denna cellinje är särskilt känd för sin betydande resistens mot cisplatin och karboplatin, vilka administrerades i höga doser under patientens behandling. OVCAR-8 används ofta i forskning som undersöker mekanismer för kemoresistens i äggstockscancer, liksom i utvecklingen av strategier för att övervinna resistens mot platinabaserade kemoterapier.
OVCAR-8-cellerna uppvisar en epitelial morfologi och växer adherent i odling. Cellinjen kännetecknas av molekylära och fenotypiska egenskaper som förknippas med höggradig äggstockscancer, inklusive förändringar i mekanismer för reparation av DNA-skador och andra vägar som bidrar till tumöröverlevnad under kemoterapeutisk stress. Till skillnad från vissa andra cellinjer för äggstockscancer uppvisar OVCAR-8 inte något påvisbart uttryck av metallothionein, ett protein som tros spela en roll för resistens mot tungmetallbaserade läkemedel. Denna cellinje uppvisar dock korsresistens mot kadmium och andra ämnen, vilket tyder på att alternativa resistensmekanismer är inblandade, t.ex. ökade glutationnivåer och förbättrad DNA-reparationskapacitet.
OVCAR-8 är ett värdefullt verktyg i preklinisk forskning för screening av kemoterapeutiska medel, utvärdering av riktade terapier och studier av biologin bakom kemoresistens. Forskare använder denna cellinje för att utforska kombinationer av läkemedel som är utformade för att göra resistenta tumörer känsliga för standardbehandlingar. Dessutom ger OVCAR-8 insikter i de genetiska och molekylära anpassningar av äggstockscancerceller som ligger bakom deras överlevnad och uthållighet trots aggressiva kemoterapiregimer. Dess kliniska relevans och resistensprofil gör den till en viktig resurs för att främja forskning och terapiutveckling inom äggstockscancer.

Vävnad	Äggstock
Sjukdom	Adenokarcinom i äggstockarna

Synonymer

- OVCAR 8
- NIH:OVCAR-8
- OVCAR8
- Ovcar8
- OVCAR.8
- OVCA8
- OVCAR-8/EGFP_LC3

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Kvinna
Tillväxtegenskaper	Följsam
Biosäkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Epitelliknande
Fördubblingstid	24-32 timmar

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIERARE

Källa

OVCAR-8 (Cytion katalognummer 305383)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1629

UTTRYCK OCH MOTTAGLIGHET

Mutationsprofil

Mutation: CTNNB1, Simple, p.Gln26Arg (c.77A>G), heterozygot; Mutation: ERBB2, enkel, p.Gly776Val (c.2327G>T), heterozygot; Mutation: KRAS, Simple, p.Pro121His (c.362C>A), heterozygot; Mutation: TP53, Simple, c.376-1G>A (p.Tyr126_Lys132del, c.376_396del21), homozygot, mutation i skarvacceptor

HANTERING OCH ODLING

Odlingsmedium

RPMI 1640, med: 2,1 mM stabilt glutamin, med: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär.

Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS

Dissociationsmedel	Accutase
Såtäthet	3–4 x 10^4 celler/ml

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	64 år
Etnicitet	Kaukasisk

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Garanti

På Cytion står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes