ZR-75-30

305389

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

ZR-75-30 е човешка клетъчна линия за рак на гърдата, получена от дуктален карцином. Проучванията за геномно профилиране показват, че ZR-75-30 съдържа амплификация на гена ERBB2/HER2, който е ключов фактор при подгрупа от ракови заболявания на гърдата. Тази амплификация води до повишена експресия на протеина HER2, която е свързана с повишена пролиферация и резистентност към определени терапии. Освен това ZR-75-30 показва промени в сигналния път на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR), включително увеличаване на свързаните с EGFR гени, което предполага, че клетъчната линия може да бъде полезна за изучаване на HER2-таргетирани терапии и механизмите на резистентност към тях.
Транскриптомните анализи причисляват ZR-75-30 към луминалния подтип на рака на гърдата, което потвърждава значението ѝ за изучаване на отговора на ендокринната терапия. Клетъчната линия е включена в проучвания, оценяващи подходите на прецизната медицина, при които молекулярното профилиране е помогнало да се предскаже отговорът на целевите лечения. Като се имат предвид молекулярните ѝ характеристики, ZR-75-30 се използва широко като предклиничен модел за оценка на терапии, насочени към хормоналните рецептори, и инхибитори на HER2, което я прави ценен инструмент в изследванията на рака на гърдата.

Тъкан	Гърди, Млечна жлеза
Заболяване	Инвазивен карцином на гърдата без специален тип
Място на метастазите	Асцит

Синоними

- ZR75-30
- ZR7530

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Женски
Свойства, свързани с растежа	Привърженик
Ниво на биологична безопасност	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфология	Епителиален
Тип клетка	Епителиален
Време за удвояване	110 часа

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

ZR-75-30 (каталожен номер 305389 на Cytion)

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606
Целозавър	CVCL_1661

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

Мутационен профил

Мутация: Сливане на гени, APPBP2 + HGNC, PHF20L1, Име(а)=APPBP2-PHF20L1., Сливане на гени, BCAS3 + HGNC, HOXB9, Име(а)=BCAS3-HOXB9. Сливане на гени, COL14A1 + HGNC, SKAP1, Име(а)=COL14A1-SKAP1. Сливане на гени, DDX5 + HGNC, DEPTOR, Име(а)=DDX5-DEPTOR. Сливане на гени, BCAS3 + HGNC, ERBB2, Име(а)=ERBB2-BCAS3. Сливане на гени, ENPP2 + HGNC, PLEC, Име(а)=PLEC-ENPP2, PLEC1-ENPP2. Сливане на гени, PCGF2 + HGNC, TAOK1, Име(а)=TAOK1-PCGF2. Сливане на гени, NRIP1 + HGNC, TIAM1, Име(а)=TIAM1-NRIP1. Сливане на гени, ARHGAP32 + HGNC, TIMM23, Име(а)=TIMM23-ARHGAP32. Сливане на гени, LASP1 + HGNC, TRPS1, Име(а)=TRPS1-LASP1. Сливане на гени, CWC25 + HGNC, USP32, Име(на)=USP32-CWC25, USP32-CCDC49. Сливане на гени, OPRD1 + HGNC, ZMYM4, Име(а)=ZMYM4-OPRD1. Мутация, BRAF, проста, p.Ile326Thr (c.977T>C), хетерозиготна, CDH1, проста, p.Glu243Ter (c.727G>T), хомозиготна.

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

RPMI 1640, w: 2,0 mM стабилен глутамин, w: 2,0 g/L NaHCO3 (номер на статията в Cytion 820700a)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.

Добавки

Допълнете средата с 10% FBS, 10 µg/ml инсулин

Обновяване на течността	2 до 3 пъти седмично

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	47 години
Етническа принадлежност	Афроамериканец

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали	Yes