ZR-75-30

305389

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

ZR-75-30 er en human brystkræftcellelinje, der stammer fra et duktalt karcinom. Studier af genomisk profilering har vist, at ZR-75-30 har amplifikation af ERBB2/HER2-genet, som er en vigtig drivkraft i en delmængde af brystkræft. Denne amplifikation resulterer i forhøjet HER2-proteinekspression, som er blevet forbundet med øget spredning og resistens over for visse behandlingsformer. Derudover udviser ZR-75-30 ændringer i signalvejen for den epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR), herunder gevinster af EGFR-relaterede gener, hvilket tyder på, at cellelinjen kan være nyttig til at studere HER2-målrettede terapier og deres resistensmekanismer.
Transkriptomiske analyser har placeret ZR-75-30 inden for den luminale undertype af brystkræft, hvilket understøtter dens relevans for studier af endokrine behandlingsresponser. Cellelinjen er blevet inkluderet i studier, der evaluerer præcisionsmedicinske tilgange, hvor molekylær profilering har hjulpet med at forudsige respons på målrettede behandlinger. På grund af dens molekylære egenskaber bruges ZR-75-30 i vid udstrækning som en præklinisk model til evaluering af hormonreceptor-målrettede behandlinger og HER2-hæmmere, hvilket gør den til et værdifuldt værktøj i brystkræftforskningen.

Væv	Bryst, brystkirtel
Sygdom	Invasivt brystkarcinom uden særlig type
Metastasested	Ascites

Synonymer

- ZR75-30
- ZR7530

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Kvinde
Vækstegenskaber	Tilhænger
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Epitelial
Celletype	Epitelial
Fordoblingstid	110 timer

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

ZR-75-30 (Cytion katalognummer 305389)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1661

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Mutationsprofil

Mutation: Genfusion, APPBP2 + HGNC, PHF20L1, Navn(e)=APPBP2-PHF20L1, Genfusion, BCAS3 + HGNC, HOXB9, Navn(e)=BCAS3-HOXB9. Genfusion, COL14A1 + HGNC, SKAP1, Navn(e)=COL14A1-SKAP1. Genfusion, DDX5 + HGNC, DEPTOR, Navn(e)=DDX5-DEPTOR. Genfusion, BCAS3 + HGNC, ERBB2, Navn(e)=ERBB2-BCAS3. Genfusion, ENPP2 + HGNC, PLEC, Navn(e)=PLEC-ENPP2, PLEC1-ENPP2. Genfusion, PCGF2 + HGNC, TAOK1, Navn(e)=TAOK1-PCGF2. Genfusion, NRIP1 + HGNC, TIAM1, Navn(e)=TIAM1-NRIP1. Genfusion, ARHGAP32 + HGNC, TIMM23, Navn(e)=TIMM23-ARHGAP32. Genfusion, LASP1 + HGNC, TRPS1, Navn(e)=TRPS1-LASP1. Genfusion, CWC25 + HGNC, USP32, Navn(e)=USP32-CWC25, USP32-CCDC49. Genfusion, OPRD1 + HGNC, ZMYM4, Navn(e)=ZMYM4-OPRD1. Mutation, BRAF, Simple, p.Ile326Thr (c.977T>C), Heterozygot, CDH1, Simple, p.Glu243Ter (c.727G>T), Homozygot.

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10 % FBS, 10 µg/ml insulin

Væskeudskiftning	2 til 3 gange om ugen

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	47 år
Etnisk tilhørsforhold	Afroamerikaner

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytіon står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes