ZR-75-30

305389

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

ZR-75-30 är en human bröstcancercellinje som härrör från ett duktalt karcinom. Genomiska profileringsstudier har visat att ZR-75-30 har en förstärkning av ERBB2/HER2-genen, en viktig drivkraft i en delmängd av bröstcancer. Denna amplifiering resulterar i ett förhöjt uttryck av HER2-protein, vilket har kopplats till ökad proliferation och resistens mot vissa behandlingar. Dessutom uppvisar ZR-75-30 förändringar i signalvägen för den epidermala tillväxtfaktorreceptorn (EGFR), inklusive förstärkningar av EGFR-relaterade gener, vilket tyder på att cellinjen kan vara användbar för att studera HER2-riktade behandlingar och deras resistensmekanismer.
Transkriptomiska analyser har placerat ZR-75-30 inom den luminala subtypen av bröstcancer, vilket stöder dess relevans för att studera svar på endokrina behandlingar. Cellinjen har inkluderats i studier som utvärderar precisionsmedicinska metoder, där molekylär profilering har hjälpt till att förutsäga svar på riktade behandlingar. Med tanke på dess molekylära egenskaper används ZR-75-30 ofta som en preklinisk modell för utvärdering av hormonreceptorinriktade behandlingar och HER2-hämmare, vilket gör den till ett värdefullt verktyg inom bröstcancerforskningen.

Vävnad	Bröst, bröstkörtel
Sjukdom	Invasiv bröstcancer av ingen speciell typ
Metastaseringsställe	Ascites

Synonymer

- ZR75-30
- ZR7530

KLASSIFICERING

Organism	Människa
Kön	Kvinna
Tillväxtegenskaper	Följsam
Biosäkerhetsnivå	1

EGENSKAPER

Morfologi	Epitelial
Celltyp	Epitelial
Fördubblingstid	110 timmar

IDENTIFIERARE

Källa

ZR-75-30 (Cytion katalognummer 305389)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1661

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

UTTRYCK OCH MOTTAGLIGHET

Mutationsprofil

Mutation: Genfusion, APPBP2 + HGNC, PHF20L1, Namn(en)=APPBP2-PHF20L1.Genfusion, BCAS3 + HGNC, HOXB9, Namn(en)=BCAS3-HOXB9. Genfusion, COL14A1 + HGNC, SKAP1, Namn(s)=COL14A1-SKAP1. Genfusion, DDX5 + HGNC, DEPTOR, Namn(s)=DDX5-DEPTOR. Genfusion, BCAS3 + HGNC, ERBB2, Namn(s)=ERBB2-BCAS3. Genfusion, ENPP2 + HGNC, PLEC, Namn(s)=PLEC-ENPP2, PLEC1-ENPP2. Genfusion, PCGF2 + HGNC, TAOK1, Namn(en)=TAOK1-PCGF2. Genfusion, NRIP1 + HGNC, TIAM1, Namn (s)=TIAM1-NRIP1. Genfusion, ARHGAP32 + HGNC, TIMM23, Namn(s)=TIMM23-ARHGAP32. Genfusion, LASP1 + HGNC, TRPS1, Namn(t)=TRPS1-LASP1. Genfusion, CWC25 + HGNC, USP32, Namn(en)=USP32-CWC25, USP32-CCDC49. Genfusion, OPRD1 + HGNC, ZMYM4, Namn(en)=ZMYM4-OPRD1. Mutation, BRAF, Simple, p.Ile326Thr (c.977T>C), Heterozygot, CDH1, Simple, p.Glu243Ter (c.727G>T), Homozygot.

HANTERING OCH ODLING

Odlingsmedium

RPMI 1640, med: 2,0 mM stabilt glutamin, med: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfär	37°C, 5%CO2, befuktad atmosfär.

Kosttillskott

Komplettera mediet med 10% FBS, 10 µg/ml insulin

Vätskeförnyelse	2 till 3 gånger per vecka

Upptining och odling

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROLL OCH KRYOKONSERVERING

Sterilitet

Mykoplasmakontaminering utesluts med hjälp av både PCR-baserade analyser och luminiscensbaserade metoder för mykoplasmadiagnostik. För att säkerställa att det inte finns någon kontaminering av bakterier, svamp eller jäst utsätts cellkulturerna för dagliga visuella inspektioner.

Frysmedel	Som kryokonserveringsmedium använder vi komplett tillväxtmedium (inklusive FBS) + 10% DMSO för adekvat viabilitet efter upptining, eller CM-1 (Cytion katalognummer 800100), som innehåller optimerade osmoprotektanter och metaboliska stabilisatorer för att förbättra återhämtningen och minska kryoinducerad stress.

Förvaringsförhållanden

För långtidsförvaring, placera flaskorna i flytande kväve i ångfas vid ca -150 till -196 °C. Förvaring vid -80 °C är acceptabelt endast som ett kort mellanliggande steg innan överföring till flytande kväve.

Leveransvillkor

Kryopreserverade cellinjer skickas på torris i validerade, isolerade förpackningar med tillräckligt med kylmedel för att hålla cirka -78 °C under hela transporten. Vid mottagandet ska behållaren omedelbart inspekteras och flaskorna utan dröjsmål överföras till lämplig förvaring.

DONATOR

Donatorns ålder	47 år
Etnicitet	Afroamerikan

JURIDISKA FRÅGOR OCH SÄKERHET

Säkerhetsföreskrifter

När man planerar att förvara en kryovial i flytande kväve för framtida upptining är det obligatoriskt att följa strikta säkerhetsåtgärder. Lämpliga skyddshandskar och skyddskläder är nödvändiga, och ansiktsmask eller skyddsglasögon måste användas vid överföring av frysta prover till eller från tanken med flytande kväve. Detta för att minska risken för skador på grund av eventuella explosioner i frysbehållaren vid borttagning, vilket kan leda till att vassa fragment projiceras.

Garanti

På Cytіon står vi bakom våra produkters kvalitet och livskraft.
Vi garanterar att våra celler är livsdugliga vid odlingens början i 60 dagar efter leverans från våra anläggningar.
Vi försäkrar att allt material överensstämmer med de specifikationer som beskrivs i analyscertifikatet och/eller produktbladet
För fullständig information, se vår <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantiförklaring

Avtal om materialöverföring krävs	Yes