SCC-9

305390

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

SCC-9 on ihmisen suun levyepiteelisolusyövän (OSCC) solulinja, jota käytetään yleisesti pään ja kaulan alueen syöpien tutkimuksessa, erityisesti kasvaimen etenemisen, apoptoosin ja hoidon tehon tutkimisessa. OSCC on yleinen pään ja kaulan alueen syöpämuoto, jonka viiden vuoden elossaololuku on alhainen, minkä vuoksi SCC-9:n kaltaiset solulinjat ovat välttämättömiä syövän biologian ymmärtämisessä ja mahdollisten hoitostrategioiden tutkimisessa.
SCC-9-soluja on käytetty tutkimuksissa, joissa on arvioitu erilaisten kemoterapeuttisten aineiden ja luonnollisten yhdisteiden vaikutuksia suusyöpään. Esimerkiksi kversetiinin, ravinnon flavonoidin, on osoitettu indusoivan SCC-9-soluissa sekä nekroosia että apoptoosia ajasta ja annoksesta riippuvaisesti. Kversetiinin antiproliferatiiviset vaikutukset liittyivät tymidylaattisyntaasin, DNA-synteesin avainentsyymin, estämiseen, mikä johtaa solusyklin S-vaiheen pysähtymiseen. Nekroosin induktio havaittiin varhain, kun taas pitkäaikainen altistus johti apoptoosiin kaspaasi-3:n aktivoitumisen kautta. Vastaavasti kurkumiinin on osoitettu estävän SCC-9-solujen proliferaatiota säätelemällä miR-9:n ilmentymistä, joka on kasvaimen tukahduttamiseen liittyvä mikroRNA. Kurkumiini tukahduttaa Wnt/β-kateniini-signalointireittiä ja vähentää siten keskeisten onkogeenisten tekijöiden, kuten sykliini D1:n, tasoja.
Nämä havainnot korostavat SCC-9-solujen merkitystä uusien syöpälääkkeiden testaamisessa ja OSCC:n kehittymisen molekyylimekanismien selvittämisessä, erityisesti Wnt/β-kateniinin kaltaisten reittien kohdentamisessa ja apoptoosin ja solusyklin säätelyn roolin arvioinnissa.

Kudos	Kieli
Sairaus	Okasolusyöpä

Synonyymit

- SCC 9
- SCC9
- SFCI-SCC-09

LUOKITTELU

Organismi	Ihminen
Sukupuoli	Mies
Kasvuominaisuudet	Kiinnittynyt
Bioturvallisuustaso	1

TUNNISTEET

Lähdeviite

SCC-9 (Cytionin luettelonumero 305390)

NCBI-verotunnus	9606
Cellosaurus	CVCL_1685

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Proteiinin ilmentyminen

Epidermaaliset keratiinit, involukriini (vähäinen)

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3,1 g/L glukoosia, w: 2,5 mM L-glutamiinia, w: 15 mM HEPES, w: 0,5 mM natriumpyruvaattia, w: 1,2 g/L NaHCO3 (Cytionin artikkelinumero 820400a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 %:lla FBS:llä

Dissosiaatioreagenssi	Accutase

Soluviljely

Poista vanha väliaine tarttuneista soluista ja pese ne PBS:llä, josta puuttuu kalsiumia ja magnesiumia. Käytä T25-pulloissa 3-5 ml PBS:ää ja T75-pulloissa 5-10 ml. Peitä sitten solut kokonaan Accutase-valmisteella, käyttäen 1-2 ml T25-pulloissa ja 2,5 ml T75-pulloissa. Anna solujen inkuboitua huoneenlämmössä 8-10 minuuttia solujen irtoamiseksi. Inkuboinnin jälkeen solut sekoitetaan varovasti 10 ml:n väliaineella niiden resuspendoimiseksi ja sentrifugoidaan sitten 300xg:n nopeudella 3 minuutin ajan. Hävitä supernatantti, suspendoi solut uudelleen tuoreeseen väliaineeseen ja siirrä ne uusiin pulloihin, jotka sisältävät jo tuoretta väliaineita.

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

LAHJOITTAJA

Luovuttajan ikä	25 vuotta

Etnisyys	Kaukasialainen

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes