PANC 08.13

305391

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Leírás

A PANC 08.13 sejtvonal – más néven PL9 – egy adenokarcinómából származó hasnyálmirigyrák-sejtmodell. Számos, a genomikus variációk – többek között az allélvesztés, a homozigóta deléciók és az általánosabb kromoszómális instabilitás – megértésére irányuló tanulmányban szerepelt. Ez a sejtvonal egy kiterjedt hasnyálmirigyrák-modellkészlet része, amelyet a ráksejtek szomatikus változásainak elemzésére használnak, különösen akkor, ha nincs megfelelő normál szövet, így ideális a nagy felbontású genetikai térképezéshez.
Egy, az Affymetrix 100K SNP-mikrochipeket felhasználó tanulmányban a PANC 08.13-at 25 másik hasnyálmirigyrák-sejtvonallal együtt vizsgálták. Ezek a mikrochipek lehetővé tették az egy nukleotid polimorfizmusok (SNP-k) nagy sűrűségű elemzését, és feltárták az allélállapotot a genom egészén anélkül, hogy megfelelő normál mintákra lett volna szükség. Az ilyen tanulmányok segítenek azonosítani az allélvesztés (LOH), a géndeléciók és a kromoszómális rekombinációs események kritikus régióit, amelyek gyakran fordulnak elő a hasnyálmirigyrákos sejtekben.
A PANC 08.13 genetikai jellemzése magában foglalja a hasnyálmirigyrákkal jellemzően összefüggő hajtó génekben – például a KRAS, TP53, CDKN2A és SMAD4 génekben – előforduló gyakori mutációkat. Ezek a genetikai rendellenességek a hasnyálmirigy-duktális adenokarcinóma jellegzetes jegyei, és hozzájárulnak a kontrollálatlan sejtproliferációhoz, a sejtciklus szabályozásának zavarához, valamint a hibás apoptózis-mechanizmusokhoz. A PANC 08.13-hoz hasonló sejtvonalakat felhasználó tanulmányok lehetővé teszik a célzott terápiák kifejlesztését és új terápiás sebezhetőségek azonosítását a hasnyálmirigyrákban.

Szövet	Hasnyálmirigy
Betegség	Adenokarcinóma

Alkalmazások

3D sejtkultúra, rákkutatás

Szinonimák

- Panc 8.13
- Panc-08.13
- PANC-08-13
- Panc_08_13
- Panc08.13
- Panc8.13
- Panc-8_13
- Panc-813
- PANC 813
- Panc813
- PANC813
- PANC0813
- Panc0813
- Pa14C
- PL9
- PL-9

OSZTÁLYOZÁS

Organizmus	Ember
Szex	Férfi
Növekedési tulajdonságok	Hűséges

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Biológiai biztonsági szint	1

JELLEMZŐK

Morfológia	Epithelszerű
Sejttípus	Epithelsejt
Daganatképző	Igen; Igen, meztelen vagy SCID egerek esetében
Kettőzési idő	20 óra

AZONOSÍTÓK

Hivatkozás

PANC 08.13 (Cytion katalógusszám: 305391)

NCBI adóazonosító szám	9606
Cellosaurus	CVCL_1638

KIFEJEZŐDÉS ÉS FOGÉKONYSÁG

Antigén-expresszió

MHC I. osztály +; MHC II. osztály –

Onkogének

K-ras+

Mutációs profil

Mutáció: KRAS, egyszerű, p.Gly12Asp (c.35G>A), homozigóta; Mutáció: SMAD4, egyszerű, p.Cys123Metfs*2 (c.366dupA) (c.366_367insA), homozigóta

KEZELÉS ÉS TENYÉSZTÉS

Táptalaj

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabil glutamin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion 820700a cikkszám)

Inkubációs környezet	37°C, 5%CO2, párásított légkör.

Kiegészítők

A tápközeget egészítsük ki 15%-os FBS-sel és 0,01 mg/ml inzulinval

Diszociációs reagens	Accutase

Átültetés

Rutinszerű adherens sejtkultúrához: Szívja le a régi táptalajt az adherens sejtekről, és mossa le őket PBS-szel a maradék táptalaj eltávolítása érdekében. A PBS leszívása után adjunk hozzá a tenyésztőedény méretének megfelelő mennyiségű tripszin/EDTA-oldatot (pl. 1 ml T25 lombikhoz, 3 ml T75 lombikhoz), és inkubáljuk szobahőmérsékleten vagy 37°C-on, amíg a sejtek leválnak (5-10 perc). Ellenőrizzük a leválást mikroszkóp alatt, és ha szükséges, óvatosan kopogtassuk meg az edényt a sejtek kiszabadításához. Ha a sejtek leváltak, adjunk hozzá teljes tápfolyadékot a tripszin/EDTA inaktiválásához, óvatosan szuszpendáljuk újra a sejteket, és a sejtszuszpenzió egy aliquotáját helyezzük át egy új, friss tápfolyadékot tartalmazó tenyésztőedénybe. Helyezze az edényt 37 °C-ra és 5%CO2-ra beállított inkubátorba, és 2-3 naponta cserélje a tápfolyadékot.

Ültetési sűrűség	1–3 × 10^4/cm^2
Folyadékcsere	hetente 2-3 alkalommal

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Felolvasztás és tenyésztés

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS KRIOKONZERVÁLÁS

Meddőség

A mikoplazma-szennyeződést mind a PCR-alapú vizsgálatokkal, mind a lumineszcencia-alapú mikoplazma-kimutatási módszerekkel kizárják. A bakteriális, gombás vagy élesztőgombás szennyeződés elkerülése érdekében a sejtkultúrákat napi vizuális ellenőrzésnek vetik alá.

Fagyasztóközeg	Krioprezerváló táptalajként teljes növekedési táptalajt (beleértve az FBS-t) + 10% DMSO-t használunk a megfelelő kiolvasztás utáni életképesség érdekében, vagy CM-1-et (Cytion katalógusszám: 800100), amely optimalizált ozmoprotektánsokat és metabolikus stabilizátorokat tartalmaz a regenerálódás fokozása és a krio-indukált stressz csökkentése érdekében.

Tárolási feltételek

Hosszú távú tartósítás céljából helyezze az üvegeket gőzfázisú folyékony nitrogénbe, körülbelül -150 és -196 °C közötti hőmérsékleten. A -80 °C-on történő tárolás csak rövid átmeneti lépésként fogadható el a folyékony nitrogénbe való átvitel előtt.

Szállítási feltételek

A kriokonzervált sejtvonalakat szárazjégen, validált, szigetelt csomagolásban szállítják, elegendő hűtőközeggel, hogy a szállítás során a hőmérsékletet körülbelül -78 °C-on tartsák. Átvételkor azonnal vizsgálja meg a tárolóedényt, és haladéktalanul helyezze át az injekciós üvegeket a megfelelő tárolóhelyre.

ADOMÁNYOZÓ

Az adományozó életkora	85 év
Etnikai hovatartozás	Kaukázusi

JOGI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági óvintézkedések

Ha egy kriovialitást folyékony nitrogénben tervezünk tárolni a későbbi kiolvasztás céljából, akkor kötelező betartani a szigorú biztonsági intézkedéseket. A megfelelő védőkesztyű és védőruházat elengedhetetlen, és a fagyasztott minták folyékony nitrogéntartályba vagy a folyékony nitrogéntartályból történő átvitele során arcmaszk vagy védőszemüveg használata szükséges. Ez azért van, hogy csökkentsék a kriovialis anyagok eltávolításakor bekövetkező esetleges robbanásból eredő sérülésveszélyt, amely éles szilánkok kilövellését eredményezheti.

Garancia

A Cytionnál kiállunk termékeink minősége és életképessége mellett.
Garantáljuk, hogy sejtjeink a tenyésztés megkezdésekor életképesek lesznek, a létesítményünkből történő kiszállítás után 60 napig.
Biztosítjuk, hogy minden anyag megfelel az analitikai tanúsítványban és/vagy a terméklapon leírt specifikációknak
A teljes részleteket lásd <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"">Garancia nyilatkozatunkban

Anyagátadási megállapodás szükséges	Yes