PANC 08.13

305391

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Apraksts

Šūnu līnija PANC 08.13, kas pazīstama arī kā PL9, ir no adenokarcinomas atvasināts aizkuņģa dziedzera vēža šūnu modelis. Tā ir iekļauta pētījumos, kuru mērķis ir izprast genomiskās variācijas, tostarp alēļu zudumu, homozigotiskas delēcijas un plašāku hromosomu nestabilitāti. Šī šūnu līnija ir daļa no plaša aizkuņģa dziedzera vēža modeļu kopuma, ko izmanto, lai analizētu somatiskas izmaiņas vēža šūnās, jo īpaši gadījumos, kad nav atbilstošu normālu audu, tādējādi padarot to ideāli piemērotu augstas izšķirtspējas ģenētiskajai kartēšanai.
Pētījumā, kurā tika izmantoti Affymetrix 100K SNP mikromatricas, PANC 08.13 tika pētīta kopā ar 25 citām aizkuņģa dziedzera vēža šūnu līnijām. Šīs mikromatricas ļāva veikt augstas blīvuma analīzi vienu nukleotīdu polimorfismiem (SNP) un atklāja alēļu statusu visā genomā, neizmantojot atbilstošus normālus paraugus. Šādi pētījumi palīdz identificēt kritiskos alēļu zuduma (LOH) reģionus, gēnu delēcijas un hromosomu rekombinācijas gadījumus, kas ir bieži sastopami aizkuņģa dziedzera vēža šūnās.
PANC 08.13 ģenētiskajā raksturojumā ietilpst biežas mutācijas vadītājgēnos, kas parasti saistīti ar aizkuņģa dziedzera vēzi, piemēram, KRAS, TP53, CDKN2A un SMAD4. Šie ģenētiskie defekti ir raksturīgi aizkuņģa dziedzera duktālajai adenokarcinomai un veicina nekontrolētu šūnu proliferāciju, traucētu šūnu cikla regulāciju un apoptozes mehānismu darbības traucējumus. Pētījumi, kuros izmanto šūnu līnijas, piemēram, PANC 08.13, ļauj izstrādāt mērķtiecīgas terapijas un identificēt jaunus terapeitiskos vājos punktus aizkuņģa dziedzera vēža ārstēšanā.

Audums	Aizkuņģa dziedzeris
Slimība	Adenokarcinoma

Pieteikumi

3D šūnu kultūras, Vēža pētniecība

Sinonīmi

- Panc 8.13
- Panc-08.13
- PANC-08-13
- Panc_08_13
- Panc08.13
- Panc8.13
- Panc-8_13
- Panc-813
- PANC 813
- Panc813
- PANC813
- PANC0813
- Panc0813
- Pa14C
- PL9
- PL-9

KLASIFIKĀCIJA

Organisms	Cilvēks
Sekss	Vīrietis
Augšanas īpašības	Atbalstītājs

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Bioloģiskās drošības līmenis	1

RAKSTURLIELUMI

Morfoloģija	Epitēlijveidīgs
Šūnu tips	Epitēlija šūna
Tumorogēns	Jā; jā, nude vai SCID pelēm
Laiks, kas nepieciešams, lai skaits dubultojās	20 stundas

IDENTIFIKATORI

Atsauce

PANC 08.13 (Cytion kataloga numurs 305391)

NCBI nodokļu identifikācijas numurs	9606
Cellosaurus	CVCL_1638

PAZĪMES UN UZŅĒMĪBA

Antigēna ekspresija

MHC I klase +; MHC II klase –

Onkogēni

K-ras+

Mutāciju profils

Mutācija: KRAS, vienkārša, p.Gly12Asp (c.35G>A), homozigota; Mutācija: SMAD4, vienkārša, p.Cys123Metfs*2 (c.366dupA) (c.366_367insA), homozigota

APSTRĀDE UN AUDZĒŠANA

Barotne

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabils glutamīns, w: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Cytion izstrādājuma numurs 820700a)

Inkubācijas vide	37°C, 5%CO_2, mitrināta atmosfēra.

Papildinājumi

Papildiniet barotni ar 15 % FBS un 0,01 mg/ml insulīna

Disociācijas reaģents	Accutase

Pārstādīšana

Parastai adherentu šūnu kultūrai: Lai noņemtu atlikušo barotni, aspirējiet veco barotni no pielipušajām šūnām un izskalojiet tās ar PBS, lai noņemtu atlikušo barotni. Pēc PBS atsūknēšanas pievienojiet atbilstošu tripsīna/EDTA šķīduma tilpumu atkarībā no kultūras trauka lieluma (piemēram, 1 ml T25 kolbai, 3 ml T75 kolbai) un inkubējiet istabas temperatūrā vai 37 °C, līdz šūnas atdalās (5-10 minūtes). Novērot atdalīšanos ar mikroskopu un, ja nepieciešams, viegli piesitiet trauku, lai atbrīvotu šūnas. Pēc atdalīšanās pievienot pilnu barotni, lai inaktivētu tripsīnu/EDTA, uzmanīgi resuspendēt šūnas un šūnu suspensijas alikvotu pārvietot jaunā barotnē ar svaigu barotni. Ievietot trauku inkubatorā, kas iestatīts 37 °C temperatūrā ar 5 %CO_2, un ik pēc 2-3 dienām mainīt barotni.

Sēšanas blīvums	1–3 × 10^4/cm^2
Šķidruma atjaunošana	2 līdz 3 reizes nedēļā

Atkausēšana un kultivēšana

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITĀTES KONTROLE UN KRIOKONSERVĀCIJA

Sterilitāte

Mikoplazmas piesārņojums tiek izslēgts, izmantojot gan uz PCR balstītus testus, gan uz luminiscenci balstītas mikoplazmas noteikšanas metodes.
Lai pārliecinātos, ka nav baktēriju, sēnīšu vai rauga piesārņojuma, šūnu kultūras katru dienu vizuāli pārbauda.

Saldēšanas barotne	Kā kriokonservēšanas barotni mēs izmantojam pilnvērtīgu augšanas barotni (ieskaitot FBS) + 10 % DMSO, lai nodrošinātu pietiekamu dzīvotspēju pēc atkausēšanas, vai CM-1 (Cytion kataloga numurs 800100), kas ietver optimizētus osmoprotektorus un metaboliskos stabilizatorus, lai uzlabotu atveseļošanos un samazinātu krioinducēto stresu.

Uzglabāšanas nosacījumi

Ilgstošai uzglabāšanai flakonus ievietojiet šķidrā slāpeklī ar tvaika fāzi aptuveni -150 līdz -196 °C temperatūrā. Uzglabāšana -80 °C temperatūrā ir pieļaujama tikai kā īss starpposms pirms pārvietošanas uz šķidro slāpekli.

Piegādes nosacījumi

Kriokonservētas šūnu līnijas tiek sūtītas uz sausā ledus apstiprinātā, izolētā iepakojumā ar pietiekamu dzesēšanas šķidruma daudzumu, lai visā transportēšanas laikā uzturētu aptuveni -78 °C temperatūru. Pēc saņemšanas nekavējoties pārbaudiet iepakojumu un nekavējoties pārvietojiet flakonus uz atbilstošu uzglabāšanas vietu.

ZIEDOTĀJS

Donora vecums	85 gadi
Etniskā piederība	Kaukāzietis

JURIDISKIE JAUTĀJUMI UN DROŠĪBA

Drošības pasākumi

Plānojot uzglabāt kriokviālu šķidrā slāpeklī turpmākai atkausēšanai, obligāti jāievēro stingri drošības pasākumi. Ir nepieciešami piemēroti aizsargcimdi un apģērbs, un, pārvietojot sasaldētos paraugus uz šķidrā slāpekļa tvertni vai no tās, ir jālieto sejas maska vai aizsargbrilles. Tas jādara, lai mazinātu traumu risku, ko var radīt iespējamas kriokrioviālu eksplozijas, kas var izraisīt asu fragmentu izmešanu.

Garantija

Uzņēmumā Cytion mēs atbalstām savu produktu kvalitāti un dzīvotspēju.
Mēs garantējam, ka mūsu šūnas būs dzīvotspējīgas kultivēšanas sākumā 60 dienas pēc nosūtīšanas no mūsu ražotnēm.
Mēs nodrošinām, ka visi materiāli atbilst analīzes sertifikātā un/vai produkta lapā aprakstītajām specifikācijām
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu <a href=""/"/Kas mēs esam/garantija/"" hreflang=""x-default"">Garantijas paziņojumu

Nepieciešams materiālu nodošanas līgums	Yes