PANC 08.13

305391

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

De PANC 08.13-cellijn, ook bekend als PL9, is een celmodel voor alvleesklierkanker dat is afgeleid van een adenocarcinoom. Deze cellijn is gebruikt in onderzoeken die gericht zijn op het in kaart brengen van genomische variaties, waaronder allelverlies, homozygote deleties en bredere chromosomale instabiliteit. Deze cellijn maakt deel uit van een uitgebreide reeks alvleesklierkankermodellen die worden gebruikt voor het analyseren van somatische veranderingen in kankercellen, met name bij gebrek aan bijbehorend normaal weefsel, waardoor deze cellijn ideaal is voor genetische kartering met hoge resolutie.
In een onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van Affymetrix 100K SNP-arrays, werd PANC 08.13 samen met 25 andere alvleesklierkankercellijnen onderzocht. Deze arrays maakten een analyse met hoge dichtheid van enkelvoudige nucleotidepolymorfismen (SNP's) mogelijk en brachten de allelische status in het gehele genoom aan het licht zonder dat er bijpassende normale monsters nodig waren. Dergelijke studies helpen bij het identificeren van kritieke regio's met allelverlies (LOH), genverwijderingen en chromosomale recombinatiegebeurtenissen, die veel voorkomen in alvleesklierkankercellen.
De genetische karakterisering van Panc 08.13 omvat veelvoorkomende mutaties in drivergenen die doorgaans in verband worden gebracht met alvleesklierkanker, zoals KRAS, TP53, CDKN2A en SMAD4. Deze genetische defecten zijn kenmerkend voor ductaal adenocarcinoom van de alvleesklier en dragen bij aan ongecontroleerde celproliferatie, verstoorde regulering van de celcyclus en defecte apoptosemechanismen. Onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van cellijnen zoals PANC 08.13 maakt de ontwikkeling van gerichte therapieën en de identificatie van nieuwe therapeutische kwetsbaarheden bij alvleesklierkanker mogelijk.

Weefsel	Alvleesklier
Ziekte	Adenocarcinoom

Toepassingen

3D celkweek, Kankeronderzoek

Synoniemen

- Panc 8.13
- Panc-08.13
- PANC-08-13
- Panc_08_13
- Panc08.13
- Panc8.13
- Panc-8_13
- Panc-813
- PANC 813
- Panc813
- PANC813
- PANC0813
- Panc0813
- Pa14C
- PL9
- PL-9

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Man

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Epitheelachtig
Celtype	Epitheelcel
Tumorverwekkend	Ja; ja bij naakte muizen of SCID-muizen
Verdubbelingstijd	20 uur

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

Panc 08.13 (Cytion-catalogusnummer 305391)

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1638

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Antigeenexpressie

MHC klasse I +; MHC klasse II -

Oncogenen

K-ras+

Mutatieprofiel

Mutatie: KRAS, enkelvoudig, p.Gly12Asp (c.35G>A), homozygoot; Mutatie: SMAD4, eenvoudig, p.Cys123Metfs*2 (c.366dupA) (c.366_367insA), homozygoot

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiele Glutamine, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytion artikelnummer 820700a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Voeg aan het medium 15% FBS en 0,01 mg/ml insuline toe

Dissociatiereagens	Accutase

Heruitplanten

Voor routinematige adherente celkweek: Zuig het oude kweekmedium van de adherente cellen af en was ze met PBS om eventueel achtergebleven medium te verwijderen. Voeg na het opzuigen van de PBS het juiste volume trypsine/EDTA-oplossing toe op basis van de grootte van het kweekvat (bijv. 1 ml voor een T25-kolf, 3 ml voor een T75-kolf) en incubeer bij kamertemperatuur of 37 °C totdat de cellen loskomen (5-10 minuten). Controleer de onthechting onder een microscoop en tik zo nodig voorzichtig op het vat om de cellen los te maken. Voeg na het losmaken volledig medium toe om de trypsine/EDTA te inactiveren, resuspendeer de cellen voorzichtig en breng een aliquot van de celsuspensie over in een nieuw kweekvat met vers medium. Plaats het kweekvat in een incubator die is ingesteld op 37°C met 5%CO2 en ververs het medium elke 2-3 dagen.

Zaaidichtheid	1-3 × 10^4/cm^2
Vloeistofverversing	2 tot 3 keer per week

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	85 jaar
Etnische afkomst	Kaukasisch

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes