MOLM-13

305393

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

MOLM-13-cellelinjen er en human akut myeloid leukæmi (AML)-cellelinje, der oprindeligt stammer fra en patient diagnosticeret med AML-M5a (akut monocytisk leukæmi, FAB-klassifikation). Denne linje blev etableret på tidspunktet for sygdommens tilbagefald efter tidligere progression fra myelodysplastisk syndrom (MDS). MOLM-13-celler indeholder MLL-AF9-genfusionen, der skyldes en insertion, ins(11;9)(q23;p22p23), og udviser yderligere kromosomafvigelser, såsom trisomi 8, et almindeligt træk forbundet med AML.
Med hensyn til fænotypiske egenskaber udtrykker MOLM-13-celler myeloide og monocytassocierede markører, herunder CD33, CD13 og CD15. De mangler imidlertid ekspression af CD34, en markør for hæmatopoietiske stamceller og progenitorceller, hvilket adskiller dem fra andre leukæmi-subtyper. MOLM-13-celler udviser også monoblastoid morfologi med fint kromatin og fremtrædende nukleoler. Funktionelt er de i stand til at differentiere sig til makrofaglignende celler ved eksponering for specifikke cytokiner såsom interferon-gamma (IFN-γ) og tumornekrosefaktor-alfa (TNF-α), som også øger ekspressionen af myelomonocytiske markører.
MOLM-13 fungerer som en vigtig model til undersøgelse af leukemogenese, især mekanismerne bag MLL-omarrangerede leukæmier. Det er også vidt brugt i præklinisk forskning, herunder evaluering af nye terapier såsom CD70-specifikke CAR-T-celler, som har vist sig effektive mod MOLM-13 in vitro og i xenotransplantationsmodeller. Dette gør MOLM-13 til et uvurderligt redskab til at udforske målrettede terapeutiske tilgange til højrisiko-AML.

Væv	Perifert blod
Sygdom	Akut myeloid leukæmi hos voksne

Synonymer

- MOLM13
- Molm13
- Molm 13

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Mand
Vækstegenskaber	Affjedring
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Lymfoblast-lignende

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

MOLM-13 (Cytion-katalognummer 305393)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_2119

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Antigenudtryk

CD3 -, CD4 +, CD14 -, CD15 +, CD19 -, CD33 +, CD34 -, cy CD68 +, HLA-DR -

Mutationsprofil

Mutation: FLT3, ueksplicit, intern tandemduplikation; Genfusion: KMT2A-MLLT3, MLL-MLLT3, MLL-AF9

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

RPMI 1640, m: 2,0 mM stabil glutamin, m: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Cytion artikelnummer 820700a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO_2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Såtæthed	Oprethold kulturen mellem 4 x 10^5 og 2 x 10^6 celler/ml.
Væskeudskiftning	2 til 3 gange om ugen

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	20 år

Etnisk tilhørsforhold	Japansk

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes