MOLM-13

305393

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

MOLM-13 rakuliin on inimese äge müeloidne leukeemia (AML) rakuliin, mis on algselt saadud AML-M5a (äge monotsüütiline leukeemia, FAB klassifikatsioon) diagnoosiga patsiendilt. See liin loodi haiguse retsidiivi ajal, pärast eelnevat progresseerumist müelodüsplastilisest sündroomist (MDS). MOLM-13 rakud sisaldavad MLL-AF9 geeni fusiooni, mis on tekkinud insertsiooni ins(11;9)(q23;p22p23) tulemusel, ning neil esinevad täiendavad kromosoomianomaaliad, nagu trisoomia 8, mis on AML-iga seotud tavaline tunnus.
Fenotüübiliste omaduste poolest ekspresseerivad MOLM-13 rakud müeloidseid ja monotsüütidega seotud markereid, sealhulgas CD33, CD13 ja CD15. Siiski puudub neil hematopoeetiliste tüvi- ja eellaste rakkude marker CD34 ekspressioon, mis eristab neid teistest leukeemia alatüüpidest. MOLM-13 rakud näitavad ka monoblastoidset morfoloogiat peene kromatiini ja silmapaistvate tuumakehade näol.
Funktsionaalselt on nad võimelised diferentseeruma makrofaagilaadseteks rakkudeks, kui nad puutuvad kokku spetsiifiliste tsütokiinidega, nagu interferoon-gamma (IFN-γ) ja tuumornekroosifaktor-alfa (TNF-α), mis suurendavad ka müelomonootsüütide markerite ekspressiooni. MOLM-13 on oluline mudel leukeemogeneesi uurimiseks, eriti MLL-ümberkorraldatud leukeemiate aluseks olevate mehhanismide uurimiseks. Seda kasutatakse laialdaselt ka prekliinilistes uuringutes, sealhulgas uute ravimeetodite hindamisel, nagu CD70-spetsiifilised CAR-T-rakud, mis on näidanud efektiivsust MOLM-13 vastu in vitro ja ksenotransplantaadi mudelites. See teeb MOLM-13-st hindamatu vahendi kõrge riskiga AML-i sihtotstarbeliste ravivõimaluste uurimiseks.

Kude	Perifeerne veri
Haigus	Täiskasvanute äge müeloidne leukeemia

Sünonüümid

- MOLM13
- Molm13
- Molm 13

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Inimene
Sugu	Mees
Kasvuvõime	Vedrustus
Bioloogilise ohutuse tase	1

OMADUSED

Morfoloogia	Lümfoblastilaadsed

TUNNUSED

Viide

MOLM-13 (Cytioni kataloginumber 305393)

NCBI maksukood	9606
Cellosaurus	CVCL_2119

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

AVALDUMINE JA VASTUVÕTLIKKUS

Antigeeni ekspressioon

CD3-, CD4+, CD14-, CD15+, CD19-, CD33+, CD34-, cy CD68+, HLA-DR-

Mutatsiooniprofiil

Mutatsioon: FLT3, ebaselge, sisemine tandemduplikatsioon; Geeni fusioon: KMT2A-MLLT3, MLL-MLLT3, MLL-AF9

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilne glutamiin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytioni artikli number 820700a)

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendada söötme 10% FBS-ga

Külvitihedus	Säilitage kultuur vahemikus 4 x 10^5 kuni 2 x 10^6 rakku/ml.
Vedeliku vahetus	2 kuni 3 korda nädalas

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Külmutuskeskkond	Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni katalooginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Doonori vanus	20 aastat

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Etniline kuuluvus	Jaapani

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Tagatise avaldusest

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes