JIMT-1

305433

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

Bunková línia JIMT-1 je odvodená od HER2-pozitívneho ľudského karcinómu prsníka a je známa svojou rezistenciou na trastuzumab, bežne používanú terapiu zameranú na HER2. Vďaka tomu je JIMT-1 cenným modelom na štúdium mechanizmov rezistencie na anti-HER2 liečbu a na vývoj nových terapeutických stratégií. Na rozdiel od mnohých iných bunkových línií HER2-pozitívneho karcinómu prsníka JIMT-1 napodobňuje klinické prípady, v ktorých sa pozorujú počiatočné odpovede na terapiu cielenú na HER2, ale následne sa vyvinie rezistencia. Vďaka tejto vlastnosti sa stal nástrojom pri skúmaní účinnosti nových liekov a kombinovaných terapií zameraných na prekonanie rezistencie na trastuzumab.
Bunky JIMT-1 sa využívajú aj v štúdiách skúmajúcich vzájomné pôsobenie medzi HER2 a inými signálnymi dráhami, ako sú tie, ktoré zahŕňajú receptor epidermálneho rastového faktora (EGFR). Vzájomné pôsobenie týchto dráh prispieva k rezistencii buniek na konvenčné terapie. Výskum ukázal, že bunky JIMT-1 variabilne reagujú na rôzne inhibítory tyrozínkinázy (TKI) a konjugáty protilátok s liekmi (ADC). Napríklad, zatiaľ čo bunková línia vykazuje rezistenciu na trastuzumab-emtansín (T-DM1) a vykazuje len čiastočnú citlivosť na novšie látky, ako je trastuzumab-deruxtecan (T-DXd), ukázalo sa, že alternatívne ADC, ako je disitamab vedotín (DV), môžu ponúknuť zvýšenú účinnosť. Štúdie in vitro poukazujú na všestrannosť JIMT-1 pri skríningu liekov, ktoré sú zamerané nielen na HER2, ale aj na iné molekulárne dráhy. Tieto štúdie poskytujú dôležité údaje na hodnotenie synergických účinkov kombinovanej liečby zahŕňajúcej ADC a TKI alebo nové cielené terapie. Správanie bunkovej línie v rôznych scenároch rezistencie na lieky zdôrazňuje jej význam pri predklinickom vývoji liekov, najmä v prípade HER2-pozitívneho karcinómu prsníka so získanou alebo vnútornou rezistenciou.

Tkanivo	Prsia
Choroba	Duktálny karcinóm prsníka
Miesto metastáz	Pleurálny výpotok

Synonymá

- JIMT1
- JIMT

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Žena
Rastové vlastnosti	Prívrženec
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Epitelu podobné

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

JIMT-1 (katalógové číslo Cytion 305433)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_2077

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Onkogény

HER-2 (necitlivý na lieky inhibujúce HER-2, napr. trastuzumab), ER-, PR-, AR-

Mutčný profil

Mutácia: PIK3CA, p.Cys420Arg (c.1258T>C), heterozygotná; Mutácia: PIK3CA, p.Cys420Arg (c.1258T>C), heterozygotná: TP53, p.Arg248Trp (c.742C>T), homozygotná

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

DMEM, w: 4,5 g/l glukózy, w: 4 mM L-glutamínu, w: 3,7 g/l NaHCO3, w: 1,0 mM pyruvátu sodného (číslo výrobku Cytion 820300a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 10 % tepelne inaktivovaného FBS

Disociačné činidlo	Accutase

Rozmnožovanie kultúr

Odstráňte staré médium z adherovaných buniek a premyte ich PBS, ktorý neobsahuje vápnik a horčík. Pre banky T25 použite 3 - 5 ml PBS a pre banky T75 použite 5 - 10 ml. Potom bunky úplne pokryte Accutase, pričom použite 1 - 2 ml pre banky T25 a 2,5 ml pre banky T75. Nechajte bunky inkubovať pri izbovej teplote 8-10 minút, aby sa oddelili. Po inkubácii jemne premiešajte bunky s 10 ml média, aby boli znovu suspendované, a potom ich 3 minúty odstreďujte pri 300xg. Supernatant zlikvidujte, bunky znovu rozmiešajte v čerstvom médiu a preneste ich do nových fliaš, ktoré už obsahujú čerstvé médium.

Hustota výsevu	1 x 10^4 buniek/cm^2

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	62 rokov
Etnická príslušnosť	Kaukazský

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes