OE19

305441

معلومات عامة

الوصف

هو خط خلايا سرطانية غدية من المريء البشري مشتق من الورم الأساسي لمريض مصاب بسرطان غدي مرتبط بمريء باريت. يستخدم هذا الخط OE19 الخلوي على نطاق واسع في الأبحاث التي تركز على سرطانات المريء، ولا سيما في دراسة تكوين الأورام في سياق تطور مريء باريت. يُستخدم كنموذج لدراسة الآليات الجزيئية الكامنة وراء تطور السرطان الغدي والاستجابات العلاجية وآليات المقاومة في الأورام الخبيثة في الجهاز الهضمي العلوي. شكلًا ظهاريًا وتلتصق في ظروف الاستزراع القياسية. وتتميز بتغيرات جينية وخصائص جزيئية نموذجية لسرطان المريء الغدي، بما في ذلك OE19 تظهر خلايا مناسبًا بشكل خاص OE19 وهو سمة مميزة لسلوك الورم العدواني وهدف مهم سريريًا للعلاج. وهذا يجعل HER2/neu (ERBB2)، الإفراط في التعبير عن لاستكشاف OE19 مثل الأجسام المضادة أحادية النسيلة ومثبطات التيروزين كيناز. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم خلايا HER2، لاختبار العلاجات التي تستهدف بالإضافة إلى آليات التهرب المناعي والتفاعل مع البيئة PI3K/AKT، و MAPK/ERK مسارات الإشارات الحاسمة لتطور السرطان، بما في ذلك مسارات الميكروية للورم.

ذا قيمة لتقييم عوامل العلاج الكيميائي والعلاجات المستهدفة والتركيبات الجديدة التي تهدف إلى التغلب على OE19 في الدراسات قبل السريرية، يعتبر مقاومة الأدوية. كما يستخدم خط الخلايا في نماذج الزرع الغريبة لتقييم نمو الورم والفعالية العلاجية في الجسم الحي. إن ملفه الجزيئي وأهميته بالنسبة موردًا مهمًا لتعزيز فهم وعلاج هذا الورم الخبيث الصعب OE19 لسرطان الغدة المرتبط بمريء باريت يجعل.

الأنسجة	المريء
المرض	السرطان الغدي

المرادفات

- OE-19
- JROECL 19
- JROECL19
- OEC19

التصنيف

كائن حي	إنسان
الجنس	ذكر
خصائص النمو	الملتزم
مستوى السلامة البيولوجية	1

الخصائص

المورفولوجيا	شبيه بالظهارة
زمن المضاعفة	ساعة 50-60

المعرّفات

المرجع

OE19 (رقم كتالوج Cytion 305441)

رقم التعريف الضريبي لدى NCBI	9606
سيلوصور	CVCL_1622

التعبير والقابلية للإصابة

الأنماط الطفريّة

التحور: TP53، بسيط، p.Asn310Lysfs*27 (c.929dup) (c.929_930ins1)، متغاير

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

RPMI 1640، ث: 2.0 جم/لتر NaHCO3 (820700 رقم المادة aمن سايتيون) ث: 2.0 مللي مولار جلوتامين مستقر،

بيئة الحضانة	37 درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب.

المكملات الغذائية

قم بتزويد الوسط ب 10٪ من ال FBS

كاشف التفكك	أكوتاز 10 دقائق عند 37 درجة مئوية
كثافة البذر	إلى 5 × 10^4 خلية/سم2 2

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.
ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

وسط التجميد	من أجل الحفاظ DMSO 10% + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية ،(رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزموبيروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

المانح

عمر المتبرع	72 سنة
الأصل العرقي	أوروبي

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

الضمان

نلتزم في Cytion، في Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

يلزم إبرام اتفاقية نقل المواد	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB