OE19

305441

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Description

OE19 est une lignée cellulaire humaine d'adénocarcinome œsophagien dérivée de la tumeur primaire d'un patient atteint d'un adénocarcinome associé à un œsophage de Barrett. Cette lignée cellulaire est largement utilisée dans la recherche axée sur les cancers de l'œsophage, en particulier pour étudier la tumorigenèse dans le contexte de la progression de l'œsophage de Barrett. OE19 sert de modèle pour étudier les mécanismes moléculaires sous-jacents au développement de l'adénocarcinome, les réponses thérapeutiques et les mécanismes de résistance dans les tumeurs malignes de la partie supérieure du tube digestif.
Les cellules OE19 présentent une morphologie épithéliale et adhèrent dans des conditions de culture standard. Elles se caractérisent par des altérations génomiques et des caractéristiques moléculaires typiques de l'adénocarcinome œsophagien, notamment la surexpression de HER2/neu (ERBB2), une caractéristique du comportement tumoral agressif et une cible cliniquement significative pour le traitement. Cela rend OE19 particulièrement pertinent pour tester les thérapies ciblées HER2, telles que les anticorps monoclonaux et les inhibiteurs de tyrosine kinase. En outre, les cellules OE19 sont utilisées pour explorer les voies de signalisation essentielles à la progression du cancer, notamment les voies MAPK/ERK et PI3K/AKT, ainsi que les mécanismes d'évasion immunitaire et d'interaction avec le microenvironnement tumoral.
Dans les études précliniques, OE19 est précieux pour évaluer les agents chimiothérapeutiques, les thérapies ciblées et les nouvelles combinaisons visant à surmonter la résistance aux médicaments. La lignée cellulaire est également utilisée dans des modèles de xénogreffes pour évaluer la croissance tumorale et l'efficacité thérapeutique in vivo. Son profil moléculaire et sa pertinence pour l'adénocarcinome lié à l'œsophage de Barrett font de OE19 une ressource importante pour faire progresser la compréhension et le traitement de cette malignité difficile.

Tissu	Œsophage
Maladie	Adénocarcinome

Synonymes

- OE-19
- JROECL 19
- JROECL19
- OEC19

CLASSIFICATION

Organisme	Humain
Sexe	Homme
Propriétés de croissance	Adepte
Niveau de biosécurité	1

CARACTÉRISTIQUES

Morphologie	De type épithélial
Temps de doublement	50 à 60 heures

IDENTIFIANTS

Référence

OE19 (numéro de catalogue Cytion 305441)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Numéro d'identification fiscale NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_1622

EXPRESSION ET SENSIBILITÉ

Profil mutationnel

Mutation : TP53, simple, p.Asn310Lysfs*27 (c.929dup) (c.929_930ins1), hétérozygote

MANIPULATION ET CULTURE

Milieu de culture

RPMI 1640, w : 2.0 mM Glutamine stable, w : 2.0 g/L NaHCO3 (numéro d'article Cytion 820700a)

Atmosphère d'incubation	37°C, 5%CO2, atmosphère humidifiée.

Compléments alimentaires

Compléter le milieu avec 10% de FBS

Réactif de dissociation	Accutase, 10 min à 37 °C
Densité de semis	2 à 5 x 10^4 cellules/cm^2

Décongélation et mise en culture

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTRÔLE QUALITÉ ET CRYOCONSERVATION

Stérilité

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes basées sur la luminescence.
Pour s'assurer de l'absence de contamination bactérienne, fongique ou levurienne, les cultures cellulaires font l'objet d'inspections visuelles quotidiennes.

Milieu de congélation	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (comprenant du FBS) + 10 % de DMSO pour une viabilité adéquate après décongélation, ou CM-1 (numéro de catalogue 800100 de Cytion), qui comprend des osmoprotectants et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryogénisation.

Conditions de stockage

Pour une conservation à long terme, placer les flacons dans de l'azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre -150 et -196 °C environ. Le stockage à -80 °C n'est acceptable qu'en tant qu'étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l'azote liquide.

Conditions de livraison

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées sur glace sèche dans des emballages isolés et validés, avec suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ -78 °C tout au long du transport. À la réception, inspecter immédiatement le conteneur et transférer sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONATEUR

Âge du donneur	72 ans
Origine ethnique	Européen

ASPECTS JURIDIQUES ET SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Lorsque l'on envisage de stocker un cryovial dans l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est obligatoire de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Des gants et des vêtements de protection appropriés sont indispensables, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de sécurité est requise pendant le transfert des échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Ceci afin de réduire le risque de blessures dues à l'explosion potentielle des cryoviaux lors de leur retrait, qui peut entraîner la projection de fragments tranchants.

Garantie

Chez Cytion, nous nous portons garants de la qualité et de la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant 60 jours après l'expédition de nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le certificat d'analyse et/ou la fiche produit
Pour plus de détails, veuillez consulter notre <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default""> Déclaration de garantie

Un accord de transfert de matériel est requis	Yes