OE19

305441

INFORMASI UMUM

Deskripsi

OE19 adalah garis sel adenokarsinoma esofagus manusia yang berasal dari tumor primer pasien dengan adenokarsinoma yang terkait dengan Barrett's esophagus. Garis sel ini secara luas digunakan dalam penelitian yang berfokus pada kanker esofagus, terutama untuk menyelidiki proses tumorigenesis dalam konteks perkembangan Barrett's esophagus. OE19 berfungsi sebagai model untuk mempelajari mekanisme molekuler yang mendasari perkembangan adenokarsinoma, respons terapeutik, dan mekanisme resistensi pada neoplasma gastrointestinal atas.
Sel OE19 menunjukkan morfologi epitel dan menempel pada kondisi kultur standar. Sel ini memiliki perubahan genomik dan fitur molekuler yang khas untuk adenokarsinoma esofagus, termasuk overexpresi HER2/neu (ERBB2), yang merupakan ciri khas perilaku tumor agresif dan target terapeutik yang secara klinis signifikan. Hal ini menjadikan OE19 sangat relevan untuk menguji terapi yang menargetkan HER2, seperti antibodi monoklonal dan inhibitor tirosin kinase. Selain itu, sel OE19 digunakan untuk mengeksplorasi jalur sinyal yang kritis bagi perkembangan kanker, termasuk jalur MAPK/ERK dan PI3K/AKT, serta mekanisme penghindaran imun dan interaksi dengan mikro lingkungan tumor.
Dalam studi praklinis, OE19 berguna untuk mengevaluasi agen kemoterapi, terapi target, dan kombinasi baru yang bertujuan mengatasi resistensi obat. Garis sel ini juga digunakan dalam model xenograft untuk menilai pertumbuhan tumor dan efektivitas terapi in vivo. Profil molekulernya dan relevansinya dengan adenokarsinoma terkait Barrett's oesophagus menjadikan OE19 sumber daya penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengobatan kanker yang menantang ini.

Tisu	Kerongkongan
Penyakit	Adenokarsinoma

Sinonim

- OE-19
- JROECL 19
- JROECL19
- OEC19

KLASIFIKASI

Organisme	Manusia
Seks	Laki-laki
Sifat-sifat pertumbuhan	Pengikut
Tingkat keamanan hayati	1

KARAKTERISTIK

Morfologi	Seperti epitel
Waktu penggandaan	50-60 jam

PENGIDENTIFIKASI

Referensi

OE19 (Nomor katalog Cytion 305441)

Nomor Identifikasi Pajak NCBI	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_1622

EKSPRESI DAN KERENTANAN

Profil mutasi

Mutasi: TP53, Sederhana, p.Asn310Lysfs*27 (c.929dup) (c.929_930ins1), Heterozigot

PENANGANAN DAN BUDIDAYA

Media kultur

RPMI 1640, w: 2,0 mM Glutamin stabil, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Nomor artikel Cytion 820700a)

Suasana inkubasi	37°C, 5%CO2, atmosfer yang dilembabkan.

Suplemen

Tambahkan media dengan 10% FBS

Reagen disosiasi	Accutase 10 menit pada 37°C
Kepadatan penanaman	2 hingga 5 x 10^4 sel/cm^2

Pencairan dan pembiakan

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

PENGENDALIAN MUTU DAN KRIOPRESERVASI

Kemandulan

Kontaminasi mikoplasma disingkirkan dengan menggunakan tes berbasis PCR dan metode deteksi mikoplasma berbasis pendaran.
Untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri, jamur, atau ragi, kultur sel menjalani inspeksi visual setiap hari.

Media pembekuan	Sebagai media kriopreservasi, kami menggunakan media pertumbuhan lengkap (termasuk FBS) + 10% DMSO untuk viabilitas pasca-pencairan yang memadai, atau CM-1 (nomor katalog Cytion 800100), yang mencakup osmoprotektan yang dioptimalkan dan penstabil metabolisme untuk meningkatkan pemulihan dan mengurangi stres yang diinduksi kriopreservasi.

Kondisi penyimpanan

Untuk pengawetan jangka panjang, tempatkan botol dalam nitrogen cair fase uap pada suhu sekitar -150 hingga -196 °C. Penyimpanan pada suhu -80 °C hanya dapat diterima sebagai langkah sementara sebelum dipindahkan ke nitrogen cair.

Ketentuan pengiriman

Lini sel kriopreservasi dikirim di atas es kering dalam kemasan terisolasi yang divalidasi dengan refrigeran yang cukup untuk mempertahankan suhu sekitar -78 ° C selama perjalanan. Setelah diterima, segera periksa wadah dan pindahkan botol tanpa penundaan ke tempat penyimpanan yang sesuai.

DONATUR

Usia donor	72 tahun
Etnis	Eropa

HUKUM DAN KESELAMATAN

Tindakan pencegahan keselamatan

Ketika berencana menyimpan kriovial dalam nitrogen cair untuk pencairan di masa mendatang, Anda wajib mematuhi langkah-langkah keamanan yang ketat. Sarung tangan dan pakaian pelindung yang tepat sangat penting, dan penggunaan masker wajah atau kacamata pengaman diperlukan selama pemindahan sampel beku ke atau dari tangki nitrogen cair. Hal ini untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi ledakan cryovial pada saat pemindahan, yang dapat mengakibatkan proyeksi fragmen tajam.

Garansi

Di Cytion, kami mendukung kualitas dan kelangsungan hidup produk kami.
Kami menjamin bahwa sel kami akan dapat bertahan hidup pada awal kultur selama 60 hari setelah pengiriman dari fasilitas kami.
Kami menjamin bahwa semua bahan sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Sertifikat Analisis dan / atau Lembar Produk
Untuk detail lengkap, silakan merujuk ke <a href=""/Siapa-kami-Garansi/Garansi/"" hreflang=""x-default"">Pernyataan Jaminan kami

Diperlukan Perjanjian Transfer Material	Yes