MHCC-97H

305442

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітинна лінія MHCC-97H є моделлю гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК) людини з високим метастатичним потенціалом. Вона була створена на основі батьківської лінії MHCC97, отриманої від чоловіка-пацієнта з ГЦК, пов'язаною з інфекцією вірусом гепатиту B (ВГВ). MHCC-97H широко використовується в дослідженнях, присвячених метастазуванню раку, зокрема тому, що вона послідовно демонструє спонтанні метастази в легенях після ортотопічної імплантації в мишачих моделях. Ця особливість робить її цінним ресурсом для вивчення механізмів прогресування та метастазування ГЦК.
Клітини MHCC-97H мають епітеліальну морфологію та володіють ключовими генетичними та молекулярними характеристиками, що сприяють їх агресивному метастатичному поведінці. Лінія відома своїм підвищенням рівня металопротеїназ матриксу (MMP-2 та MMP-9), які сприяють деградації позаклітинного матриксу та інвазивним можливостям. Протеомні аналізи виявили кілька диференційно експресованих білків у MHCC-97H порівняно з його низькометастатичним аналогом MHCC-97L, включаючи підвищений рівень піруваткінази M2 та кальційзв'язуючого білка A4 S100. Ці результати підкреслюють їх корисність у вивченні молекулярних шляхів, що регулюють метастазування.
MHCC-97H використовується в доклінічних дослідженнях для тестування терапевтичних стратегій, спрямованих на метастазування. Моделі in vivo, що включають цю клітинну лінію, дозволяють дослідникам вивчати ефективність методів лікування, спрямованих на зменшення поширення метастазів, особливо в легенях. Крім того, MHCC-97H сприяє розробці біомаркерів для прогнозування агресивності ГЦК та вивченню ролі мікросередовища пухлини в метастазуванні. Ці застосування підкреслюють його критичну важливість для поглиблення нашого розуміння біології гепатоцелюлярної карциноми.

Тканина	Печінка
Хвороба	Гепатоцелюлярна карцинома дорослих

Синоніми

- MHCC 97-H
- MHCC97-H
- MHCC97H

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Чоловік
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пухлиноутворювальний	Високий метастатичний потенціал

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

MHCC-97H (номер у каталозі Cytion 305442)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606

Целозавр	CVCL_4972

ЕКСПРЕСІЯ ТА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ

Профіль мутацій

Мутація: BRD7, p.Glu277Glyfs*18 (c.830_831delAG); Мутація: KEAP1, p.Pro445Glnfs*13 (c.1334delC); Мутація: TP53, p.Glu51Ter (c.151G>T)

Віруси

Трансформант: вірус гепатиту B (HBV)

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

ДМЕМ, w: 4,5 г/л Глюкоза, w: 4 мМ L-глутамін, w: 3,7 г/л NaHCO3, w: 1,0 мМ піруват натрію (цит. номер 820300a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS

Реагент для дисоціації	Аккутаза

Пересадка в нове середовище

Видаліть старе середовище з прилиплих клітин і промийте їх PBS, в якому бракує кальцію і магнію. Для колб T25 використовуйте 3-5 мл PBS, а для колб T75 - 5-10 мл. Потім повністю покрийте клітини аккутазою, використовуючи 1-2 мл для колб T25 і 2,5 мл для колб T75. Залиште клітини інкубуватися при кімнатній температурі протягом 8-10 хвилин, щоб відокремити їх. Після інкубації обережно змішайте клітини з 10 мл середовища, щоб ресуспендувати їх, а потім центрифугуйте при 300xg протягом 3 хвилин. Викиньте надосадову рідину, ресуспендуйте клітини у свіжому середовищі та перенесіть їх у нові колби, які вже містять свіже середовище.

Щільність висіву	Від 1,5 до 4 x 10^4 клітин/см2

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	39 років
Етнічна приналежність	Китайська

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes