KGN

305446

GENERAL INFORMATION

Description

Dòng tế bào KGN là dòng tế bào u nang buồng trứng của người, được phân lập từ một bệnh nhân bị ung thư buồng trứng và được bất tử hóa để sử dụng trong các nghiên cứu khoa học. Dòng tế bào này duy trì các đặc tính chức năng của tế bào nang buồng trứng, bao gồm tổng hợp hormone, khiến nó trở thành một mô hình quý giá để nghiên cứu chức năng của tế bào nang buồng trứng, điều hòa hormone và bệnh lý buồng trứng. Tế bào KGN đã được sử dụng để nghiên cứu các cơ chế phân tử liên quan đến các rối loạn sinh sản và nội tiết như hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Chúng đặc biệt được chú ý vì phản ứng với các axit béo không bão hòa đa như axit arachidonic (AA), có thể gây stress oxy hóa (OS) và ảnh hưởng đến chức năng ty thể.
Nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với AA trong tế bào KGN làm tăng mức độ các dấu hiệu oxy hóa như các loại oxy phản ứng (ROS) và malondialdehyde (MDA), giảm khả năng chống oxy hóa tổng thể và làm suy giảm hoạt động của ty thể, dẫn đến apoptosis tế bào. Quá trình này liên quan đến sự tăng biểu hiện của yếu tố phân biệt tăng trưởng 15 (GDF15), dường như có vai trò bảo vệ chống lại tổn thương tế bào do stress oxy hóa gây ra. Ngoài ra, tế bào KGN nhạy cảm với ferroptosis, một dạng chết tế bào phụ thuộc vào sắt, đặc trưng bởi quá trình peroxidation lipid và stress oxy hóa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc hấp thu sắt thông qua thụ thể transferrin có thể thúc đẩy sản xuất ROS và góp phần vào con đường này.
Hơn nữa, tế bào KGN đã được sử dụng để nghiên cứu tác động của microRNA đối với chức năng tế bào, vì miR-93-5p đã được xác định là yếu tố thúc đẩy apoptosis và ferroptosis thông qua con đường tín hiệu NF-κB, liên kết điều hòa microRNA với rối loạn chức năng tế bào granulosa trong hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Những khả năng này khiến tế bào KGN trở thành mô hình quan trọng để nâng cao hiểu biết về sinh lý bệnh buồng trứng và khám phá các mục tiêu điều trị tiềm năng.

Tissue	Buồng trứng, nang buồng trứng, lớp tế bào granulosa
Disease	U nang tế bào granulosa buồng trứng

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	Tế bào giống fibroblast

IDENTIFIERS

Citation

KGN (Số catalog Cytion 305446)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0375

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Mutational profile

Biến dị: FOXL2, p.Cys134Trp (c.402C>G), dị hợp tử

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM:Ham's F12 (tỷ lệ 1:1), chứa: 3,1 g/L glucose, chứa: 2,5 mM L-glutamine, chứa: 15 mM HEPES, chứa: 0,5 mM natri pyruvate, chứa: 1,2 g/L $NaHCO_3$ (Số hiệu sản phẩm Cytion 820400a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO_2, môi trường ẩm.

Supplements

Bổ sung 10% huyết thanh bò phôi (FBS) vào môi trường nuôi cấy

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Loại bỏ môi trường nuôi cấy cũ khỏi các tế bào bám dính và rửa chúng bằng PBS không chứa canxi và magiê. Đối với bình T25, sử dụng 3-5 ml PBS, và đối với bình T75, sử dụng 5-10 ml. Sau đó, phủ hoàn toàn các tế bào bằng Accutase, sử dụng 1-2 ml cho bình T25 và 2,5 ml cho bình T75. Để tế bào ủ ở nhiệt độ phòng trong 8-10 phút để tách chúng ra. Sau khi ủ, nhẹ nhàng trộn tế bào với 10 ml môi trường để tái phân tán chúng, sau đó ly tâm ở 300xg trong 3 phút. Loại bỏ dịch trên, tái phân tán tế bào trong môi trường tươi và chuyển chúng vào các bình mới đã chứa môi trường tươi.

Fluid renewal	2 lần mỗi tuần

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

Sự nhiễm khuẩn Mycoplasma được loại trừ bằng cả các phương pháp xét nghiệm dựa trên PCR và các phương pháp phát hiện Mycoplasma dựa trên phát quang.
Để đảm bảo không có nhiễm khuẩn vi khuẩn, nấm hoặc men, các mẫu nuôi cấy tế bào được kiểm tra trực quan hàng ngày.

Freeze medium	Như một môi trường bảo quản đông lạnh, chúng tôi sử dụng môi trường tăng trưởng hoàn chỉnh (bao gồm FBS) + 10% DMSO để đảm bảo độ sống sau khi rã đông, hoặc CM-1 (mã sản phẩm Cytion 800100), bao gồm các chất bảo vệ thẩm thấu và chất ổn định chuyển hóa được tối ưu hóa để cải thiện quá trình phục hồi và giảm stress do đông lạnh gây ra.

Storage conditions

Để bảo quản lâu dài, hãy đặt ống nghiệm vào nitơ lỏng ở pha hơi ở nhiệt độ khoảng −150 đến −196 °C. Việc bảo quản ở −80 °C chỉ được chấp nhận như một bước trung gian ngắn hạn trước khi chuyển sang nitơ lỏng.

Shipping conditions

Các dòng tế bào được bảo quản bằng phương pháp đông lạnh được vận chuyển trên đá khô trong bao bì cách nhiệt đã được kiểm định, kèm theo lượng chất làm lạnh đủ để duy trì nhiệt độ khoảng −78 °C trong suốt quá trình vận chuyển. Khi nhận hàng, hãy kiểm tra ngay lập tức bao bì và chuyển các ống nghiệm sang nơi lưu trữ phù hợp mà không chậm trễ.

DONOR

Donor age	63 năm
Ethnicity	Nhật Bản

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Khi lập kế hoạch lưu trữ ống cryovial trong nitơ lỏng để rã đông sau này, việc tuân thủ các biện pháp an toàn nghiêm ngặt là bắt buộc. Găng tay và quần áo bảo hộ phù hợp là điều cần thiết, và việc sử dụng khẩu trang hoặc kính bảo hộ là bắt buộc trong quá trình chuyển mẫu đông lạnh vào hoặc ra khỏi bể nitơ lỏng. Điều này nhằm giảm thiểu nguy cơ chấn thương do nổ ống cryovial khi lấy ra, có thể dẫn đến việc văng ra các mảnh vỡ sắc nhọn.

Warranty

Tại Cytion, chúng tôi cam kết về chất lượng và khả năng sống của các sản phẩm của mình.
Chúng tôi đảm bảo rằng các tế bào của chúng tôi sẽ có khả năng sống tại thời điểm bắt đầu nuôi cấy trong
60 ngày kể từ khi vận chuyển từ cơ sở của chúng tôi.
Chúng tôi cam kết rằng tất cả các vật liệu tuân thủ các thông số kỹ thuật được mô tả trong
Giấy chứng nhận phân tích và/hoặc Tài liệu sản phẩm.
Để biết chi tiết đầy đủ, vui lòng tham khảo
<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Tuyên bố Bảo hành.

Material Transfer Agreement required	Yes