KYSE180

305450

GENERAL INFORMATION

Description

KYSE180 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ESCC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ESCC □□□□□□□□□□□ NRF2□NFE2L2□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□KYSE180 □□□□ NRF2 D77V □□□□□□□□□ NRF2 □□□□□□NRF2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ KYSE180 □□□ NRF2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ KYSE180 □□□ NRF2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ NRF2 □□□□□□□□□□□□□□□ KYSE180 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ NRF2 □□□□□□□□ NRF2 □□□□□□□□□ □□□KYSE180 □□□□□□□□□□□□□□□□AKR□□□□□□□□□□ AKR1C1 □ AKR1C2□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ KYSE180 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□-3,4-□□□□□□□□□EDHB□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640□□ 2.0 mM □□□□□□□□ 2.0 g/L $NaHCO_3$□Cytion □□□□ 820700a□

Incubation atmosphere	37°C□5% CO_2□□□□□□

Supplements

□□□□□□□ 10% □□□□□□FBS□

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□PBS□□□□□T25□□□□□3-5□□PBS□T75□□□□□□5-10□□□ □□□□ Accutase □□□□□□□T25 □□□□□ 1–2 □□□T75 □□□□□□ 2.5 □□□□□□□□□□□□ 8–10 □□□□□□□□ □□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 300xg □□ 3 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

□□□