HEYA8

305452

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Περιγραφή

Η κυτταρική σειρά HEYA8 αποτελεί ένα καλά χαρακτηρισμένο μοντέλο ανθρώπινου καρκίνου των ωοθηκών, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά από ασθενή με θηλώδες κυσταδενοκαρκίνωμα. Η εν λόγω κυτταρική σειρά διακρίνεται ιδιαίτερα για την επιθετική της ανάπτυξη και το μεταστατικό της δυναμικό, ενώ χρησιμοποιείται ευρέως σε έρευνες που αφορούν την παθοφυσιολογία του καρκίνου των ωοθηκών καθώς και σε θεραπευτικές μελέτες. Τα κύτταρα HEYA8 έχουν μελετηθεί εκτενώς ως προς την έκφραση της ιντερλευκίνης-8 (IL-8), μιας χημειοκίνης που συνδέεται με την εξέλιξη του καρκίνου. Η IL-8 δρα ως αυτοκρινικός αυξητικός παράγοντας, ενισχύοντας τον πολλαπλασιασμό, την αγγειογένεση και την διηθητικότητα του όγκου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υψηλά επίπεδα έκφρασης της IL-8 συσχετίζονται με αυξημένη ανάπτυξη του όγκου και πυκνότητα μικροαγγείων στα κύτταρα HEYA8. Πειραματικές μεταμοσχεύσεις με φορείς της IL-8 έχουν δείξει ότι η αυξημένη έκφραση της IL-8 μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τον πολλαπλασιασμό του όγκου, ενώ τα εξουδετερωτικά αντισώματα μειώνουν αυτή την ανάπτυξη.
Τα κύτταρα HEYA8 έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της απόκρισης του καρκίνου των ωοθηκών σε διάφορες καταστάσεις στρες, όπως η υποξία. Η υποξία προκαλεί υπερέκφραση της IL-8 σε αυτά τα κύτταρα, η οποία μεσολαβείται από οδούς στις οποίες εμπλέκονται οι οδοί PI3K/Akt και p38 MAPK. Η ενεργοποίηση αυτών των οδών ενισχύει τη μεταγραφή του γονιδίου της IL-8 μέσω παραγόντων όπως το AP-1 και το NF-κB, συμβάλλοντας στην προσαρμογή του όγκου σε περιβάλλοντα χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο και υποστηρίζοντας την επιβίωσή του και το μεταστατικό του δυναμικό. Κατά συνέπεια, αναστολείς που στοχεύουν τις οδούς PI3K και p38 MAPK διερευνώνται ως πιθανές στρατηγικές για τον μετριασμό των επιθετικών χαρακτηριστικών των κυττάρων HEYA8 και τη μείωση της εξέλιξης του όγκου.

Ιστός	Ωοθήκη
Ασθένεια	Υψηλού βαθμού ορώδες αδενοκαρκίνωμα των ωοθηκών

Συνώνυμα

- HEY-A8
- Hey-A8
- Hey A8
- HEYA8
- HeyA8
- Heya8

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

Οργανισμός	Άνθρωπος
Σεξ	Γυναίκα
Ιδιότητες ανάπτυξης	Πιστός
Επίπεδο βιοασφάλειας	1

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΆ

Παραπομπή

HEYA8 (αριθμός καταλόγου Cytion 305452)

Αριθμός φορολογικού μητρώου NCBI	9606
Κελλοσαύρος	CVCL_8878

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

Θρεπτικό μέσο

RPMI 1640, w: 2,0 mM σταθερής γλουταμίνης, w: 2,0 g/L NaHCO3 (αριθμός άρθρου Cytion 820700a)

Ατμόσφαιρα επώασης	37°C, 5%CO2, υγροποιημένη ατμόσφαιρα.

Συμπληρώματα

Συμπληρώστε το μέσο με 10% FBS

Αντιδραστήριο αποσύνδεσης	Accutase
Πυκνότητα σποράς	1-3*10^4/cm^2

Απόψυξη και καλλιέργεια

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Στειρότητα

Η μόλυνση από μυκόπλασμα αποκλείεται με τη χρήση τόσο των δοκιμασιών που βασίζονται στην PCR όσο και των μεθόδων ανίχνευσης μυκοπλάσματος με βάση τη φωταύγεια.
Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μόλυνση από βακτήρια, μύκητες ή ζύμες, οι κυτταροκαλλιέργειες υποβάλλονται σε καθημερινές οπτικές επιθεωρήσεις.

Μέσο κατάψυξης	Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του FBS) + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη, ή CM-1 (αριθμός καταλόγου Cytion 800100), το οποίο περιλαμβάνει βελτιστοποιημένα ωσμοπροστατευτικά και μεταβολικούς σταθεροποιητές για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη μείωση του στρες που προκαλείται από την κρυοσυντήρηση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196 °C. Η αποθήκευση στους -80 °C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

Όροι αποστολής

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78 °C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

ΔΩΡΗΤΉΣ

Ηλικία δωρητή	Απροσδιόριστο
Εθνικότητα	Καυκάσιος

ΝΟΜΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Μέτρα ασφαλείας

Όταν σχεδιάζετε να αποθηκεύσετε ένα κρυοφιαλίδιο σε υγρό άζωτο για μελλοντική απόψυξη, είναι υποχρεωτικό να τηρείτε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ο κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός είναι απαραίτητα, ενώ απαιτείται η χρήση μάσκας προσώπου ή γυαλιών ασφαλείας κατά τη μεταφορά κατεψυγμένων δειγμάτων προς ή από τη δεξαμενή υγρού αζώτου. Αυτό γίνεται για να μετριαστεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πιθανές εκρήξεις κρυοσωλήνων κατά την απομάκρυνση, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην προβολή αιχμηρών θραυσμάτων.

Εγγύηση

Στην Cytion, υποστηρίζουμε την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας.
Εγγυόμαστε ότι τα κύτταρά μας θα είναι βιώσιμα κατά την έναρξη της καλλιέργειας για 60 ημέρες μετά την αποστολή από τις εγκαταστάσεις μας.
Διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα υλικά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης ή/και στο Φύλλο Προϊόντος
Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Δήλωση εγγύησης

Απαιτείται συμφωνία μεταφοράς υλικού	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB