HEYA8

305452

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис

Клітинна лінія HEYA8 є добре охарактеризованою моделлю раку яєчників людини, яка була спочатку отримана від пацієнтки з папілярною цистаденокарциномою. Ця клітинна лінія особливо відома своїм агресивним ростом та метастатичним потенціалом і широко використовується в дослідженнях, присвячених патофізіології раку яєчників, а також у терапевтичних дослідженнях. Клітини HEYA8 були детально досліджені з точки зору експресії інтерлейкіну-8 (ІЛ-8) — хемокіну, пов'язаного з прогресуванням раку. ІЛ-8 діє як аутокринний фактор росту, посилюючи проліферацію, ангіогенез та інвазивність пухлини. Слід зазначити, що високий рівень експресії IL-8 корелює з посиленим ростом пухлини та щільністю мікросудин у клітинах HEYA8. Експериментальні трансфекції з використанням векторів IL-8 продемонстрували, що підвищена експресія IL-8 може суттєво прискорити проліферацію пухлини, тоді як нейтралізуючі антитіла гальмують цей ріст.
Клітини HEYA8 також використовували для вивчення реакції раку яєчників на різні стресові стани, такі як гіпоксія. Гіпоксія запускає надмірну експресію IL-8 у цих клітинах, опосередковану шляхами, що залучають PI3K/Akt та p38 MAPK. Активація цих шляхів посилює транскрипцію гена IL-8 за допомогою таких факторів, як AP-1 та NF-κB, сприяючи адаптації пухлини до середовищ з низьким вмістом кисню та підтримуючи її виживання та метастатичний потенціал. Відповідно, інгібітори, що діють на шляхи PI3K та p38 MAPK, досліджуються як потенційні стратегії для пом'якшення агресивних характеристик клітин HEYA8 та уповільнення прогресування пухлини.

Тканина	Яєчник
Хвороба	Серозна аденокарцинома яєчників високого ступеня

Синоніми

- HEY-A8
- Hey-A8
- Hey A8
- HEYA8
- HeyA8
- Heya8

КЛАСИФІКАЦІЯ

Організм	Людина
Секс	Жінка
Характеристики росту	Прихильник
Рівень біобезпеки	1

ІДЕНТИФІКАТОРИ

Посилання

HEYA8 (номер у каталозі Cytion 305452)

Ідентифікаційний номер платника податків NCBI	9606
Целозавр	CVCL_8878

ОБРОБКА ТА ВИРОЩУВАННЯ

Живильне середовище

RPMI 1640, w: 2,0 мМ стабільний глютамін, w: 2,0 г/л NaHCO3 (номер за каталожним номером 820700a)

Атмосфера інкубації	37°C, 5% CO2, волога атмосфера.

Добавки

Додайте до середовища 10% FBS

Реагент для дисоціації	Аккутаза
Щільність висіву	1–3 × 10^4/см²

Розморожування та культивування

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА КРІОКОНСЕРВАЦІЯ

Стерильність

Зараження мікоплазмою виключається за допомогою аналізів на основі ПЛР та люмінесцентних методів виявлення мікоплазми. Щоб переконатися у відсутності бактеріального, грибкового або дріжджового забруднення, клітинні культури піддаються щоденному візуальному контролю.

Середовище для заморожування	Як середовище кріоконсервування ми використовуємо повне живильне середовище (включаючи FBS) + 10% ДМСО для адекватної життєздатності після відтавання або CM-1 (номер за каталогом Cytion 800100), до складу якого входять оптимізовані осмопротектори та метаболічні стабілізатори для прискорення відновлення та зменшення кріоіндукованого стресу.

Умови зберігання

Для тривалого зберігання помістіть флакони в парофазний рідкий азот при температурі від -150 до -196 °C. Зберігання при -80 °C допустиме лише як короткий проміжний етап перед перенесенням у рідкий азот.

Умови доставки

Кріоконсервовані клітинні лінії транспортуються на сухому льоду в перевіреній ізольованій упаковці з достатньою кількістю холодоагенту для підтримання температури приблизно -78 °C під час транспортування. При отриманні негайно огляньте контейнер і без зволікань перемістіть флакони у відповідне місце зберігання.

ДОНОР

Вік донора	Не визначено
Етнічна приналежність	Кавказець

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Заходи безпеки

Плануючи зберігати кріовіал у рідкому азоті для подальшого розморожування, обов'язково слід дотримуватися суворих заходів безпеки. Під час перенесення заморожених зразків до резервуара з рідким азотом або з нього необхідно використовувати захисні рукавички та одяг, а також маску або захисні окуляри. Це необхідно для того, щоб зменшити ризик травмування від потенційних кріогенних вибухів при вилученні, які можуть призвести до розльоту гострих осколків.

Гарантія

У Cytion ми відповідаємо за якість та життєздатність нашої продукції.
Ми гарантуємо, що наші клітини будуть життєздатними на початку культивування протягом 60 днів після відвантаження з нашого заводу.
Ми запевняємо, що всі матеріали відповідають специфікаціям, описаним у сертифікаті аналізу та/або паспорті продукту
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до нашого Заяви про гарантію

Необхідна угода про передачу матеріалів	Yes