SK-GT-4

305454

GENERAL INFORMATION

Description

La línea celular SK-GT-4 es un modelo de adenocarcinoma esofágico humano derivado de un adenocarcinoma primario que surgió en una metaplasia de Barrett displásica del esófago distal. Esta línea celular forma parte de la serie SK-GT establecida en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center y ha sido fundamental para estudiar la progresión del esófago de Barrett hacia el adenocarcinoma esofágico. Las células SK-GT-4 presentan características epiteliales y constituyen una herramienta valiosa para investigar los mecanismos moleculares del cáncer de esófago, en particular aquellos relacionados con mutaciones en el gen supresor de tumores p53.
Los estudios genómicos de SK-GT-4 han identificado una mutación en el gen TP53, específicamente una transición de G a A en el codón 175 del exón 5, lo que da lugar a una sustitución de arginina por histidina. Esta mutación se ha correlacionado con la quimiorresistencia a agentes que dañan el ADN, como el 5-fluorouracilo, la mitomicina C y el cisplatino. Los estudios indican que el estado mutacional de p53 tiene un impacto significativo en la respuesta celular a la quimioterapia, influyendo en la regulación del ciclo celular y la apoptosis en las células SK-GT-4. Estas características convierten a esta línea celular en un modelo fundamental para explorar estrategias terapéuticas dirigidas a las vías asociadas a p53.
La línea celular SK-GT-4 se ha utilizado para evaluar el potencial de invasión tumoral y la respuesta a los factores de crecimiento en el adenocarcinoma de esófago. Esta línea celular ha demostrado capacidad invasiva en ensayos de cámara de Boyden, lo que resalta su relevancia para el estudio de la metástasis. La línea celular SK-GT-4 también expresa transcritos de diversos factores de crecimiento, entre ellos el TGF-β y el factor de crecimiento derivado de plaquetas, los cuales contribuyen a su fenotipo agresivo. El papel consolidado de esta línea celular en la investigación traslacional subraya su utilidad tanto en la biología básica del cáncer como en el desarrollo de fármacos.

Tissue	Esófago distal
Disease	adenocarcinoma

Synonyms

- SKGT4
- SK4

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	2

CHARACTERISTICS

Morphology	De tipo epitelial
Cell type	Célula epitelial
Doubling time	30-35 horas

IDENTIFIERS

Citation

SK-GT-4 (número de catálogo de Cytion 305454)

NCBI TaxID	9606

Cellosaurus	CVCL_2195

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Mutational profile

Mutación: KRAS, simple, p.Gly12Ala (c.35G>C), heterocigótica; Mutación: PIK3CA, simple, p.Glu542Lys (c.1624G>A), heterocigótica; Mutación: TP53, simple, p.Gln100Ter (c.298C>T), homocigótica

Viruses

EBV -, HBV -, HCV -, VIH-1 -, VIH-2 -, VPH -, HTLV-I/-II -, MLV -

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, con 2,1 mM de glutamina estable y 2,0 g/L de $NaHCO_3$ (número de artículo de Cytion: 820700a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmósfera humidificada.

Supplements

Añade al medio un 10 % de FBS

Dissociation reagent	Accutase

Subculturing

Retira el medio usado de las células adheridas y lávalas con PBS sin calcio ni magnesio. Para los frascos T25, usa de 3 a 5 ml de PBS, y para los frascos T75, usa de 5 a 10 ml. Luego, cubra las células por completo con Accutase, utilizando de 1 a 2 ml para los frascos T25 y 2,5 ml para los frascos T75. Deje que las células se incuben a temperatura ambiente durante 8 a 10 minutos para desprenderse. Después de la incubación, mezcla suavemente las células con 10 ml de medio para resuspendarlas; luego, centrifuga a 300xg durante 3 minutos. Deseche el sobrenadante, resuspenda las células en medio fresco y transfiéralas a frascos nuevos que ya contengan medio fresco.

Seeding density	2-4*10^4/cm²
Fluid renewal	De 2 a 3 veces por semana

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

Se descarta la contaminación por micoplasmas mediante ensayos basados en PCR y métodos de detección de micoplasmas basados en luminiscencia.
Para garantizar que no haya contaminación bacteriana, fúngica o por levaduras, los cultivos celulares se someten a inspecciones visuales diarias.

Freeze medium	Como medio de criopreservación, utilizamos un medio de crecimiento completo (que incluye FBS) + 10 % de DMSO para garantizar una viabilidad adecuada tras la descongelación, o CM-1 (número de catálogo de Cytion 800100), que incluye osmoprotectores y estabilizadores metabólicos optimizados para mejorar la recuperación y reducir el estrés inducido por la criopreservación.

Storage conditions

Para la conservación a largo plazo, coloque los viales en nitrógeno líquido en fase de vapor a una temperatura de entre −150 y −196 °C, aproximadamente. El almacenamiento a −80 °C solo es aceptable como un paso intermedio breve antes de transferirlos al nitrógeno líquido.

Shipping conditions

Las líneas celulares criopreservadas se envían en hielo seco, en un embalaje aislante validado que contiene suficiente refrigerante para mantener una temperatura de aproximadamente −78 °C durante todo el transporte. Al recibir el envío, revise el contenedor de inmediato y traslade los viales sin demora al lugar de almacenamiento adecuado.

DONOR

Donor age	89 años
Ethnicity	caucásico

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Cuando se planea almacenar un criovial en nitrógeno líquido para su descongelación futura, es obligatorio cumplir con estrictas medidas de seguridad. Es esencial contar con guantes y ropa de protección adecuados, y se requiere el uso de una mascarilla o lentes de seguridad durante la transferencia de muestras congeladas hacia o desde el tanque de nitrógeno líquido. Esto tiene como objetivo mitigar el riesgo de lesiones por posibles explosiones de los criotubos al retirarlos, lo que puede provocar la proyección de fragmentos afilados.

Warranty

En Cytion, respaldamos la calidad y la viabilidad de nuestros productos.
Garantizamos que nuestras células serán viables al inicio del cultivo durante
60 días a partir de la fecha de envío desde nuestras instalaciones.
Aseguramos que todos los materiales cumplen con las especificaciones descritas en el
Certificado de Análisis y/o la Ficha del Producto.
Para obtener más detalles, consulte nuestra
Declaración de garantía.

Material Transfer Agreement required	Yes