TE10

305455

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание

Клетъчната линия TE10 е част от серията TE – колекция от модели на рак на хранопровода, създадена в Япония, по-конкретно от добре диференциран плоскоклетъчен карцином на хранопровода. Клетките TE10 се отличават с епителната си морфология и растеж в монослойна култура. Тези клетки са получени от първична лезия без предходно облъчване, което ги прави представителни за биологията на нелекувани тумори.
TE10 проявява няколко ключови генетични промени, свързани с прогресията на рака на хранопровода. Те включват амплификация и свръхекспресия на гена c-erbB, съвместна амплификация на протоонкогените int-2 и hst-1, както и дисрегулация на растежни фактори като TGF-α и EGF-R. Тези молекулярни характеристики правят TE10 ценен модел за изследване на пътищата, участващи в туморния растеж, като например сигналната ос на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR). Освен това линията е използвана за изучаване на реакциите към целеви терапии и химиотерапевтични средства, което хвърля светлина върху механизмите на лекарствената резистентност.
Клетките TE10 се използват често и в тестове за инвазия и миграция поради способността им да образуват колонии в мек агар и да проявяват растеж, независим от закрепване. Тези характеристики подчертават тяхната полезност при изследването на молекулярните фактори, обуславящи метастазирането. Постоянните резултати на клетъчната линия в експерименти, фокусирани върху туморната биология и фармакологията, я превръщат във важен инструмент за транслационни изследвания в областта на рака, особено за разработването на терапевтични стратегии, насочени към плоскоклетъчния карцином на хранопровода.

Тъкан	Езофагус
Заболяване	плоскоклетъчен карцином

Синоними

- TE-10

КЛАСИФИКАЦИЯ

Организъм	Човек
Секс	Мъж
Свойства, свързани с растежа	Привърженик
Ниво на биологична безопасност	1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морфология	Подобни на епител
Тип клетка	Епителна клетка
Време за удвояване	30 часа

ИДЕНТИФИКАТОРИ

Източник

TE10 (каталожен номер на Cytion 305455)

Данъчен идентификационен номер в NCBI	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Целозавър	CVCL_1760

ПРОЯВА И ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ

Изоензими

LD, NP

Мутационен профил

Мутация: TP53, проста, p.Cys242Tyr (c.725G>A), неуточнена

ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

Хранителна среда

RPMI 1640, c: 2,1 mM стабилизиран глутамин, c: 2,0 g/L $NaHCO_3$ среда (Cytion 820700a)

Атмосфера за инкубация	37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера.

Добавки

Допълнете средата с 10% FBS

Реагент за дисоциация	Accutase
Обновяване на течността	1 до 2 пъти седмично

Размразяване и култивиране

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Стерилност

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

Среда за замразяване	Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес.

Условия за съхранение

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

Условия за доставка

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

ДАРИТЕЛ

Възраст на донора	58 години
Етническа принадлежност	Японски

ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

Мерки за безопасност

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

Гаранция

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали	Yes