TE10

305455

GENERELLE OPLYSNINGER

Beskrivelse

TE10-cellelinjen er en del af TE-serien, en samling af modeller for spiserørskræft, der er etableret i Japan, nærmere bestemt ud fra et veldifferentieret pladecellekarcinom i spiserøret. TE10-celler er kendetegnet ved deres epiteliale morfologi og vækst i monolagskultur. Disse celler stammer fra en primær læsion uden forudgående stråleeksponering, hvilket gør dem repræsentative for ubehandlet tumorbiologi.
TE10 udviser flere centrale genetiske ændringer, der er forbundet med udviklingen af spiserørskræft. Disse omfatter amplifikation og overekspression af c-erbB-genet, co-amplifikation af proto-onkogenerne int-2 og hst-1 samt dysregulering af vækstfaktorer såsom TGF-α og EGF-R. Disse molekylære egenskaber gør TE10 til en værdifuld model til undersøgelse af signalveje, der er involveret i tumorvækst, såsom signalaksen for den epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR). Derudover er cellelinjen blevet anvendt til at undersøge responser på målrettede terapier og kemoterapeutiske midler, hvilket kaster lys over mekanismerne bag lægemiddelresistens.
TE10-celler anvendes også hyppigt i invasions- og migrationsassays på grund af deres evne til at danne kolonier i blød agar og udvise forankringsuafhængig vækst. Disse egenskaber understreger deres anvendelighed i udforskningen af de molekylære drivkræfter bag metastase. Cellelinjens konsistente ydeevne i eksperimenter med fokus på tumorbiologi og farmakologi gør den til et vigtigt redskab i translationel kræftforskning, især til udvikling af behandlingsstrategier rettet mod pladecellekarcinom i spiserøret.

Væv	Spiserør
Sygdom	pladecellekræft

Synonymer

- TE-10

KLASSIFICERING

Organisme	Menneske
Køn	Mand
Vækstegenskaber	Tilhænger
Biosikkerhedsniveau	1

EGENSKABER

Morfologi	Epitel-lignende
Celletype	Epitelcelle
Fordoblingstid	30 timer

IDENTIFIKATORER

Kildehenvisning

TE10 (Cytion-katalognummer 305455)

NCBI-skattenummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1760

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

UDTRYK OG MODTAGELIGHED

Isoenzymer

LD, NP

Mutationsprofil

Mutation: TP53, enkel, p.Cys242Tyr (c.725G>A), uspecificeret

HÅNDTERING OG OPDRÆT

Næringsmedium

RPMI 1640, med 2,1 mM stabiliseret glutamin og 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Cytion 820700a)

Inkubationsatmosfære	37°C, 5%CO2, befugtet atmosfære.

Kosttilskud

Suppler mediet med 10% FBS

Dissociationsreagens	Accutase
Væskeudskiftning	1 til 2 gange om ugen

Optøning og dyrkning

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITETSKONTROL OG KRYOPRÆSERVERING

Sterilitet

Mycoplasma-kontaminering udelukkes ved hjælp af både PCR-baserede assays og luminescensbaserede mycoplasma-detektionsmetoder. For at sikre, at der ikke er nogen bakterie-, svampe- eller gærforurening, underkastes cellekulturerne daglige visuelle inspektioner.

Frysemedium	Som kryopræserveringsmedium bruger vi komplet vækstmedium (inklusive FBS) + 10 % DMSO for tilstrækkelig levedygtighed efter optøning eller CM-1 (Cytion-katalognummer 800100), som indeholder optimerede osmobeskyttende stoffer og metaboliske stabilisatorer for at forbedre genopretningen og reducere kryo-induceret stress.

Opbevaringsbetingelser

For langtidsopbevaring anbringes hætteglas i flydende nitrogen i dampfase ved ca. -150 til -196 °C. Opbevaring ved -80 °C er kun acceptabelt som et kort mellemtrin før overførsel til flydende nitrogen.

Leveringsbetingelser

Kryopræserverede cellelinjer sendes på tøris i valideret, isoleret emballage med tilstrækkeligt kølemiddel til at opretholde ca. -78 °C under hele transporten. Ved modtagelse skal beholderen straks inspiceres, og hætteglassene skal straks overføres til passende opbevaring.

DONOR

Donorens alder	58 år

Etnisk tilhørsforhold	Japansk

JURIDISKE FORHOLD OG SIKKERHED

Sikkerhedsforanstaltninger

Når man planlægger at opbevare et kryovæske i flydende nitrogen med henblik på fremtidig optøning, er det obligatorisk at overholde strenge sikkerhedsforanstaltninger. Passende beskyttelseshandsker og -tøj er afgørende, og der skal bruges ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller under overførslen af frosne prøver til eller fra tanken med flydende nitrogen. Dette er for at mindske risikoen for skader fra potentielle kryovæskeeksplosioner ved fjernelse, som kan resultere i projektion af skarpe fragmenter.

Garanti

Hos Cytion står vi inde for vores produkters kvalitet og levedygtighed.
Vi garanterer, at vores celler vil være levedygtige ved kulturens start i 60 dage efter afsendelse fra vores faciliteter.
Vi sikrer, at alle materialer er i overensstemmelse med de specifikationer, der er beskrevet i analysecertifikatet og/eller produktarket
For alle detaljer henvises til vores <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garantierklæring

Der kræves en aftale om overførsel af materiale	Yes