TE10

305455

ALGEMENE INFORMATIE

Beschrijving

De TE10-cellijn maakt deel uit van de TE-serie, een verzameling modellen voor slokdarmkanker die in Japan is opgezet, met name op basis van een goed gedifferentieerd plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm. TE10-cellen onderscheiden zich door hun epitheliale morfologie en hun groei in monolaagcultuur. Deze cellen zijn afkomstig van een primaire laesie die niet eerder aan bestraling is blootgesteld, waardoor ze representatief zijn voor de biologie van een onbehandelde tumor.
TE10 vertoont verschillende belangrijke genetische veranderingen die verband houden met de progressie van slokdarmkanker. Deze omvatten amplificatie en overexpressie van het c-erbB-gen, co-amplificatie van de proto-oncogenen int-2 en hst-1, en ontregeling van groeifactoren zoals TGF-α en EGF-R. Deze moleculaire kenmerken maken TE10 tot een waardevol model voor het onderzoeken van signaalroutes die betrokken zijn bij tumorgroei, zoals de signaalroute van de epidermale groeifactorreceptor (EGFR). Daarnaast is de lijn gebruikt om reacties op gerichte therapieën en chemotherapeutische middelen te bestuderen, wat inzicht verschaft in mechanismen van geneesmiddelresistentie.
TE10-cellen worden ook vaak gebruikt in invasie- en migratietests vanwege hun vermogen om kolonies te vormen in zachte agar en om verankeringsonafhankelijke groei te vertonen. Deze kenmerken onderstrepen hun nut bij het onderzoeken van de moleculaire drijfveren van metastase. De consistente prestaties van de cellijn in experimenten gericht op tumorbiologie en farmacologie maken deze tot een belangrijk hulpmiddel voor translationeel kankeronderzoek, met name voor de ontwikkeling van therapeutische strategieën gericht op plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm.

Weefsel	Slokdarm
Ziekte	plaveiselcelcarcinoom

Synoniemen

- TE-10

CLASSIFICATIE

Organisme	Mens
Seks	Man
Groei-eigenschappen	Aanhanger
Bioveiligheidsniveau	1

KENMERKEN

Morfologie	Epitheelachtig
Celtype	Epitheelcel
Verdubbelingstijd	30 uur

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Bronvermelding

TE10 (Cytion-catalogusnummer 305455)

NCBI-belastingnummer	9606
Cellosaurus	CVCL_1760

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESSIE EN VATBAARHEID

Iso-enzymen

LD, NP

Mutatieprofiel

Mutatie: TP53, eenvoudig, p.Cys242Tyr (c.725G>A), niet nader gespecificeerd

BEHANDELING EN KWEEK

Kweekmedium

RPMI 1640, met 2,1 mM gestabiliseerd glutamine, met 2,0 g/L $NaHCO_3$-medium (Cytion 820700a)

Incubatieomgeving	37°C, 5%CO2, bevochtigde atmosfeer.

Supplementen

Vul het medium aan met 10% FBS

Dissociatiereagens	Accutase
Vloeistofverversing	1 tot 2 keer per week

Ontdooien en kweken

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KWALITEITSCONTROLE EN CRYOPRESERVATIE

Onvruchtbaarheid

Mycoplasmaverontreiniging wordt uitgesloten met zowel PCR-gebaseerde testen als op luminescentie gebaseerde mycoplasmadetectiemethoden.
Om er zeker van te zijn dat er geen besmetting is met bacteriën, schimmels of gisten, worden de celculturen dagelijks onderworpen aan visuele inspecties.

Kweekmedium invriezen	Als cryoconserveringsmedium gebruiken we volledig groeimedium (inclusief FBS) + 10% DMSO voor voldoende levensvatbaarheid na het ontdooien, of CM-1 (Cytion catalogusnummer 800100), dat geoptimaliseerde osmoprotectanten en metabolische stabilisatoren bevat om het herstel te verbeteren en door cryo geïnduceerde stress te verminderen.

Opslagvoorwaarden

Voor langdurige bewaring plaatst u flesjes in vloeibare stikstof in dampfase bij ongeveer -150 tot -196 °C. Opslag bij -80 °C is alleen aanvaardbaar als korte tussenstap vóór overbrenging naar vloeibare stikstof.

Verzendvoorwaarden

Gecryopreserveerde cellijnen worden verzonden op droog ijs in gevalideerde, geïsoleerde verpakkingen met voldoende koelmiddel om gedurende het transport ongeveer -78 °C te handhaven. Inspecteer de verpakking onmiddellijk na ontvangst en breng de flacons onverwijld over naar de juiste opslagplaats.

DONATEUR

Leeftijd van de donor	58 jaar
Etnische afkomst	Japans

JURIDISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Veiligheidsmaatregelen

Wanneer men van plan is om een cryovial in vloeibare stikstof op te slaan om later te ontdooien, is het verplicht om strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Passende beschermende handschoenen en kleding zijn essentieel en het gebruik van een gezichtsmasker of veiligheidsbril is vereist tijdens het overbrengen van bevroren monsters naar of uit de tank met vloeibare stikstof. Dit is om het risico op letsel door mogelijke cryoviale explosies bij het verwijderen te beperken, wat kan resulteren in de projectie van scherpe fragmenten.

Garantie

Bij Cytion staan we achter de kwaliteit en levensvatbaarheid van onze producten.
We garanderen dat onze cellen levensvatbaar zijn bij het begin van de kweek gedurende 60 dagen na verzending vanuit onze faciliteiten.
We verzekeren dat alle materialen voldoen aan de specificaties beschreven in het analysecertificaat en/of productblad
Raadpleeg voor volledige informatie onze <a href=""/Wie-zijn-wij/Garantie/"" hreflang=""x-default"">Garantieverklaring

Er is een overeenkomst inzake materiaaloverdracht vereist	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB