ACT-1

305461

YLEISTÄ TIETOA

Kuvaus

ACT-1-solulinja on peräisin limasienen Dictyostelium discoideum -kannasta, joka toimii arvokkaana mallina aktiinin dynamiikan ja solujen liikkuvuuden tutkimuksessa. Dictyosteliumissa aktiini on keskeisessä roolissa solukon rakenteessa, erityisesti kemotaksisprosessissa ja solujen aggregaatiossa ravinteiden puutteen vallitessa. ACT-1-solulinja on ollut välttämätön monoklonaalisten vasta-aineiden ja aktiinin välisten vuorovaikutusten analysoinnissa, erityisesti aktiinimonomereiden spesifisten sitoutumisalueiden erottelussa sekä aktiinin rakenteellisten ja toiminnallisten reaktioiden arvioinnissa erilaisiin molekyylivuorovaikutuksiin. ACT-1:tä hyödyntävät tutkimukset ovat edistäneet merkittävästi ymmärrystä siitä, miten aktiinin aminoterminaaliset alueet vuorovaikuttavat vasta-aineiden kanssa ja vaikuttavat aktiinin polymeroitumiseen, korostaen alueita, jotka ovat ratkaisevia monomeerista filamentiksi tapahtuvassa siirtymässä ja stabiloinnissa. Erityisesti ACT-1:tä on käytetty tutkimaan monoklonaalisia vasta-aineita, jotka voivat estää aktiinin polymeroitumisen sitoutumalla selektiivisesti aktiinin monomeerimuotoihin. Tämä sitoutuminen estää filamenttien muodostumista stabiloimalla aktiinin monomeerisessa tilassaan, mikä lyhentää filamenttien pituutta ja vähentää viskositeettia, kun vasta-ainetta lisätään olemassa oleviin aktiinifilamentteihin. Nämä vaikutukset ovat hyödyllisiä aktiinia säätelevien proteiinien ja niiden mekanismien tutkimisessa soluprosesseissa. Spesifisyytensä ansiosta ACT-1-kanta on keskeinen sekä biokemiallisissa määrityksissä että immunofluoresenssitutkimuksissa, joissa hyödynnetään anti-aktinimonoklonaalisia vasta-aineita aktiinin rakenteellisten domeenien kartoittamiseen ja aktiiniin sitoutuvien proteiinien säätelevien roolien arviointiin solurakenteessa.

Kudos	Hybridoma

Synonyymit

- Act I
- ACT 1
- ACT I

LUOKITTELU

Organismi	Hiiri
Kasvuominaisuudet	Kiinnittynyt
Bioturvallisuustaso	1

OMINAISUUDET

Morfologia	Lymfoblastien kaltaiset
Solutyyppi	Pernasolut fuusioitiin NS-1-myeloomasolujen kanssa

TUNNISTEET

Lähdeviite

ACT-1 (Cytionin tuotenumero 305461)

NCBI-verotunnus	10090
Cellosaurus	CVCL_4499

ILMENTYMINEN JA ALTTIUS

Proteiinin ilmentyminen

Dictyostelium discoideumin aktiineja vastaan suunnattu monoklonaalinen immunoglobuliini (IgG1)

KÄSITTELY JA VILJELY

Viljelyalusta

RPMI 1640, w: 2,1 mM stabiilia glutamiinia, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytionin artikkelinumero 820700a)

Inkubaatioilma	37 °C, 5 %CO2, kostutettu ilmakehä.

Ravintolisät

Täydennetään elatusainetta 10 %:lla FBS:llä

Dissosiaatioreagenssi	Accutase

Soluviljely

Kerää suspensiosolut 15 ml:n putkeen ja pese kiinni olevat solut varovasti PBS:llä, josta puuttuu kalsiumia ja magnesiumia (3-5 ml T25-pulloissa ja 5-10 ml T75-pulloissa). Levitä Accutasea (1-2 ml T25-pulloihin, 2,5 ml T75-pulloihin) varmistaen, että solukerros peittyy kokonaan. Anna solujen inkuboitua huoneenlämmössä 10 minuuttia. Inkuboinnin jälkeen yhdistetään ja sentrifugoidaan sekä suspensio että adherentit solut. Sentrifugoinnin jälkeen solupelletti suspendoidaan varovasti uudelleen ja siirretään solususpensio uusiin pulloihin, jotka sisältävät tuoretta väliaineita.

Sulatus ja viljely

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

LAADUNVALVONTA JA KRYOSÄILYTYS

Hedelmättömyys

Mykoplasmakontaminaatio suljetaan pois sekä PCR-pohjaisilla määrityksillä että luminesenssiin perustuvilla mykoplasman osoitusmenetelmillä.
Bakteeri-, sieni- tai hiivakontaminaation välttämiseksi soluviljelmät tarkastetaan päivittäin silmämääräisesti.

Jäädytysaine	Kryosäilytysmediana käytämme täydellistä kasvualustaa (mukaan lukien FBS) + 10 % DMSO:ta riittävän sulatuksen jälkeisen elinkelpoisuuden varmistamiseksi tai CM-1:tä (Cytionin luettelonumero 800100), joka sisältää optimoituja osmoprotectantteja ja metabolisia stabilisaattoreita, jotka parantavat elpymistä ja vähentävät kryosäilytyksen aiheuttamaa stressiä.

Säilytysolosuhteet

Pitkäaikaissäilytystä varten injektiopullot asetetaan höyryfaasissa olevaan nestemäiseen typpeen noin -150 - -196 °C:een. Säilytys -80 °C:ssa on hyväksyttävää vain lyhyenä välivaiheena ennen siirtoa nestemäiseen typpeen.

Toimitusehdot

Kryosäilytetyt solulinjat kuljetetaan kuivajäässä validoidussa, eristetyssä pakkauksessa, jossa on riittävästi kylmäainetta, jotta lämpötila pysyy noin -78 °C:ssa koko kuljetuksen ajan. Pakkaus on tarkastettava välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja injektiopullot on siirrettävä viipymättä asianmukaiseen varastoon.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

OIKEUDELLISET JA TURVALLISUUSASIAT

Turvallisuusohjeet

Kun suunnitellaan kryoputken säilyttämistä nestemäisessä typessä sulatusta varten, on noudatettava tiukkoja turvatoimenpiteitä. Asianmukaiset suojakäsineet ja -vaatteet ovat välttämättömiä, ja kasvonaamarin tai suojalasien käyttö on välttämätöntä siirrettäessä jäädytettyjä näytteitä nestetyppisäiliöön tai siitä pois. Tällä pyritään pienentämään loukkaantumisriskiä, joka aiheutuu kryoputkien mahdollisista räjähdyksistä, jotka voivat aiheuttaa terävien sirpaleiden sinkoutumisen.

Takuu

Me Cytionilla seisomme tuotteidemme laadun ja elinkelpoisuuden takana.
Takaamme, että solumme ovat elinkelpoisia viljelyn alkaessa 60 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on lähetetty laitoksestamme.
Vakuutamme, että kaikki materiaalit ovat analyysitodistuksessa ja/tai tuoteselosteessa kuvattujen eritelmien mukaisia
Lisätietoja on <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Takuulausumassa

Aineiden siirtoa koskeva sopimus vaaditaan	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB