MUM2B

305477

ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Περιγραφή

Η κυτταρική σειρά MUM2B αποτελεί μοντέλο μεταστατικού μελανώματος του υαλοειδούς, το οποίο προέρχεται από ηπατική μετάσταση όγκου μελανώματος του υαλοειδούς. Η εν λόγω κυτταρική σειρά χρησιμοποιείται ευρέως στην έρευνα της οφθαλμικής ογκολογίας για τη μελέτη των επιθετικών και διηθητικών χαρακτηριστικών του μεταστατικού μελανώματος του υαλοειδούς. Σε αντίθεση με τις κυτταρικές σειρές πρωτογενούς μελανώματος του αμφιβληστροειδούς, η MUM2B παρουσιάζει αυξημένη μεταστατική συμπεριφορά, γεγονός που την καθιστά ένα κρίσιμο εργαλείο για την κατανόηση της εξέλιξης και της ανθεκτικότητας στη θεραπεία του προχωρημένου μελανώματος.
Έχει αποδειχθεί ότι τα κύτταρα MUM2B διατηρούν βασικούς δείκτες μελανώματος, όπως τα S-100, HMB-45 και Melan-A, επιβεβαιώνοντας τη μελανοκυτταρική τους προέλευση. Επιπλέον, αυτή η κυτταρική σειρά χαρακτηρίζεται από την ικανότητά της να μιμείται αγγειογενή πρότυπα in vitro, ένα φαινόμενο που συνδέεται με την επιθετικότητα του όγκου και το μεταστατικό δυναμικό. Η MUM2B έχει χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών που καθοδηγούν την εξέλιξη του μελανώματος, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των οδών αντοχής στην απόπτωση και της μιτοχονδριακής δυσλειτουργίας. Η κυτταρική σειρά ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένους επαγωγείς απόπτωσης, όπως το NOXA, με τρόπο ανεξάρτητο από το p53, τονίζοντας τη χρησιμότητά της στη διερεύνηση θεραπευτικών στρατηγικών που στοχεύουν σε όγκους ανθεκτικούς στην απόπτωση.
Η έρευνα με χρήση της MUM2B έχει συμβάλει σημαντικά στον εντοπισμό πιθανών θεραπευτικών στόχων για το μεταστατικό μελάνωμα. Μελέτες καταδεικνύουν την ευαισθησία της σε καινοτόμες ενώσεις, όπως οι αναστολείς της γ-σεκρετάσης (GSI), οι οποίοι προκαλούν επιλεκτικά απόπτωση στα κύτταρα του μελανώματος, ενώ δεν επηρεάζουν τα φυσιολογικά μελανοκύτταρα. Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τον ρόλο της MUM2B ως ζωτικού μοντέλου για τη δοκιμή νέων θεραπευτικών παραγόντων και τη βελτίωση της κατανόησης της βιολογίας του μεταστατικού μελανώματος του αμφιβληστροειδούς.

Ιστός	Μάτι, ουβέα
Ασθένεια	Μελάνωμα

Συνώνυμα

- MUM-2B
- MuM-2B
- Mum2B

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

Οργανισμός	Άνθρωπος
Σεξ	Γυναίκα
Ιδιότητες ανάπτυξης	Πιστός
Επίπεδο βιοασφάλειας	1

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΆ

Παραπομπή

MUM2B (αριθμός καταλόγου Cytion 305477)

Αριθμός φορολογικού μητρώου NCBI	9606
Κελλοσαύρος	CVCL_3447

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

Θρεπτικό μέσο

RPMI 1640, w: 2,0 mM σταθερής γλουταμίνης, w: 2,0 g/L NaHCO3 (αριθμός άρθρου Cytion 820700a)

Ατμόσφαιρα επώασης	37°C, 5%CO2, υγροποιημένη ατμόσφαιρα.

Συμπληρώματα

Συμπληρώστε το μέσο με 10% FBS

Αντιδραστήριο αποσύνδεσης	Accutase

Απόψυξη και καλλιέργεια

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΥΟΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Στειρότητα

Η μόλυνση από μυκόπλασμα αποκλείεται με τη χρήση τόσο των δοκιμασιών που βασίζονται στην PCR όσο και των μεθόδων ανίχνευσης μυκοπλάσματος με βάση τη φωταύγεια.
Για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει μόλυνση από βακτήρια, μύκητες ή ζύμες, οι κυτταροκαλλιέργειες υποβάλλονται σε καθημερινές οπτικές επιθεωρήσεις.

Μέσο κατάψυξης	Ως μέσο κρυοσυντήρησης, χρησιμοποιούμε πλήρες μέσο ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένου του FBS) + 10% DMSO για επαρκή βιωσιμότητα μετά την απόψυξη, ή CM-1 (αριθμός καταλόγου Cytion 800100), το οποίο περιλαμβάνει βελτιστοποιημένα ωσμοπροστατευτικά και μεταβολικούς σταθεροποιητές για την ενίσχυση της ανάκαμψης και τη μείωση του στρες που προκαλείται από την κρυοσυντήρηση.

Συνθήκες αποθήκευσης

Για μακροχρόνια συντήρηση, τοποθετήστε τα φιαλίδια σε υγρό άζωτο σε φάση ατμών σε θερμοκρασία περίπου -150 έως -196 °C. Η αποθήκευση στους -80 °C είναι αποδεκτή μόνο ως σύντομο ενδιάμεσο βήμα πριν από τη μεταφορά σε υγρό άζωτο.

Όροι αποστολής

Οι κρυοσυντηρημένες κυτταρικές σειρές αποστέλλονται σε ξηρό πάγο σε επικυρωμένη, μονωμένη συσκευασία με επαρκές ψυκτικό μέσο για τη διατήρηση περίπου των -78 °C καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατά την παραλαβή, επιθεωρήστε αμέσως τον περιέκτη και μεταφέρετε τα φιαλίδια χωρίς καθυστέρηση στην κατάλληλη αποθήκη.

ΔΩΡΗΤΉΣ

Ηλικία δωρητή	Απροσδιόριστο
Εθνικότητα	Απροσδιόριστο

ΝΟΜΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Μέτρα ασφαλείας

Όταν σχεδιάζετε να αποθηκεύσετε ένα κρυοφιαλίδιο σε υγρό άζωτο για μελλοντική απόψυξη, είναι υποχρεωτικό να τηρείτε αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Τα κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ο κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός είναι απαραίτητα, ενώ απαιτείται η χρήση μάσκας προσώπου ή γυαλιών ασφαλείας κατά τη μεταφορά κατεψυγμένων δειγμάτων προς ή από τη δεξαμενή υγρού αζώτου. Αυτό γίνεται για να μετριαστεί ο κίνδυνος τραυματισμού από πιθανές εκρήξεις κρυοσωλήνων κατά την απομάκρυνση, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην προβολή αιχμηρών θραυσμάτων.

Εγγύηση

Στην Cytion, υποστηρίζουμε την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας.
Εγγυόμαστε ότι τα κύτταρά μας θα είναι βιώσιμα κατά την έναρξη της καλλιέργειας για 60 ημέρες μετά την αποστολή από τις εγκαταστάσεις μας.
Διαβεβαιώνουμε ότι όλα τα υλικά συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης ή/και στο Φύλλο Προϊόντος
Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""""x-default"""">Δήλωση εγγύησης

Απαιτείται συμφωνία μεταφοράς υλικού	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB