MUM2B

305477

ÜLDINE TEAVE

Kirjeldus

MUM2B rakuliin on metastaatilise uveaalse melanoomi mudel, mis on saadud uveaalse melanoomi kasvaja maksametastaasist. Seda rakuliini kasutatakse laialdaselt silmaonkoloogia uuringutes, et uurida metastaatilise uveaalse melanoomi agressiivseid ja invasiivseid omadusi. Erinevalt primaarsetest uveaalse melanoomi rakuliinidest näitab MUM2B tugevamat metastaatilist käitumist, mis teeb sellest olulise vahendi edasijõudnud melanoomi progresseerumise ja raviresistentsuse mõistmiseks.
On näidatud, et MUM2B-rakud säilitavad peamised melanoomi markerid, nagu S-100, HMB-45 ja Melan-A, mis kinnitab nende melanootsüütilist päritolu. Lisaks iseloomustab seda rakuliini võime jäljendada in vitro vaskulogeenseid mustreid – nähtust, mis on seotud tuumori agressiivsusega ja metastaatilise potentsiaaliga. MUM2B-d on kasutatud melanoomi progresseerumist mõjutavate molekulaarsete mehhanismide uurimiseks, sealhulgas apoptoosiresistentsuse signaalradade ja mitokondriaalse düsfunktsiooni rolli uurimiseks. Rakuliin reageerib spetsiifilistele apoptoosi indutseerijatele, nagu NOXA, p53-st sõltumatul viisil, mis rõhutab selle kasulikkust apoptoosiresistentsetele kasvajatele suunatud ravistrateegiate uurimisel.
MUM2B-d kasutavad uuringud on oluliselt aidanud kaasa metastaatilise melanoomi potentsiaalsete ravisihte kindlaksmääramisele. Uuringud näitavad selle tundlikkust uuenduslike ühendite, näiteks γ-sekretaasi inhibiitorite (GSI) suhtes, mis indutseerivad apoptoosi selektiivselt melanoomi rakkudes, säästes samal ajal normaalsed melanootsüüdid. Need leiud rõhutavad MUM2B rolli olulise mudelina uute ravimite testimisel ja metastaatilise uveaalse melanoomi bioloogia paremal mõistmisel.

Kude	Silm, uvea
Haigus	Melanoom

Sünonüümid

- MUM-2B
- MuM-2B
- Mum2B

KLASSIFIKATSIOON

Organism	Inimene
Sugu	Naine
Kasvuvõime	Järgija
Bioloogilise ohutuse tase	1

TUNNUSED

Viide

MUM2B (Cytioni katalooginumber 305477)

NCBI maksukood	9606
Cellosaurus	CVCL_3447

KÄSITLEMINE JA KASVATAMINE

Kasvatuskeskkond

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabiilne glutamiin, w: 2,0 g/L NaHCO3 (Cytioni artikli number 820700a)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Inkubatsiooni keskkond	37°C, 5%CO2, niisutatud atmosfäär.

Toidulisandid

Täiendada söötme 10% FBS-ga

Dissotsiatsioonireaktiiv	Accutase

Sulatamine ja kasvatamine

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KVALITEEDIKONTROLL JA KRÜOKONSERVEERIMINE

Viljatus

Mükoplasmakontaminatsioon on välistatud nii PCR-põhiste analüüside kui ka luminestsentsil põhinevate mükoplasma tuvastamise meetodite abil.
Bakteriaalse, seene- või pärmsaaste puudumise tagamiseks kontrollitakse rakukultuure iga päev visuaalselt.

Külmutuskeskkond	Krüosäilitusvedelikusena kasutame täielikku kasvukeskkonda (sh FBS) + 10% DMSO, et tagada piisav elujõulisus pärast sulatamist, või CM-1 (Cytioni kataloginumber 800100), mis sisaldab optimeeritud osmoprotektante ja metaboolseid stabilisaatoreid, et parandada taastumist ja vähendada krüostressi.

Säilitamistingimused

Pikaajaliseks säilitamiseks asetage viaalid aurufaasis vedela lämmastikuga umbes -150 kuni -196 °C juures. Säilitamine temperatuuril -80 °C on vastuvõetav ainult lühikese vaheetapina enne vedela lämmastikuga üleviimist.

Tarne- ja kohaletoimetamistingimused

Krüokonserveeritud rakuliinid transporditakse kuiva jääga valideeritud, isoleeritud pakendis, milles on piisavalt külmutusainet, et säilitada kogu transpordi jooksul ligikaudu -78 °C. Vastuvõtmisel kontrollige konteinerit kohe ja viige viaalid viivitamatult sobivasse hoiuruumi.

ANNETAJA

Doonori vanus	Täpsustamata
Etniline kuuluvus	Täpsustamata

ÕIGUSLIKUD JA OHUTUSALASED KÜSIMUSED

Ohutusnõuded

Kui plaanitakse krüoviaalide säilitamist vedelas lämmastikus tulevase sulatamise eesmärgil, on kohustuslik järgida rangeid ohutusmeetmeid. Asjakohased kaitsekindad ja -riietus on hädavajalikud ning külmutatud proovide vedela lämmastiku mahutisse või mahutist väljaviimisel tuleb kasutada näomaski või kaitseprille. See on vajalik selleks, et vähendada vigastuste ohtu, mis tuleneb võimalikest krüoviaalide plahvatustest eemaldamisel, mille tagajärjel võivad välja paiskuda teravad killud.

Garantii

Cytion seisab oma toodete kvaliteedi ja elujõulisuse eest.
Me garanteerime, et meie rakud on elujõulised kasvatamise alguses 60 päeva jooksul pärast meie rajatistest saatmist.
Tagame, et kõik materjalid vastavad analüüsisertifikaadis ja/või tootelehel kirjeldatud spetsifikatsioonidele
Täielikke üksikasju leiate meie <a href="""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang="""x-default"">Tagatise avaldusest

Vajalik on materjalide üleandmise leping	Yes