MUM2B

305477

BENDRA INFORMACIJA

Aprašymas

MUM2B ląstelių linija yra metastazinės uvealinės melanomos modelis, gautas iš uvealinės melanomos naviko metastazės kepenyse. Ši ląstelių linija plačiai naudojama akių onkologijos tyrimuose, siekiant ištirti agresyvias ir invazines metastazinės uvealinės melanomos savybes. Skirtingai nuo pirminių uvealinės melanomos ląstelių linijų, MUM2B pasižymi padidintu metastazavimo aktyvumu, todėl ji yra svarbi priemonė, padedanti suprasti pažengusios melanomos progresavimą ir atsparumą gydymui.
Įrodyta, kad MUM2B ląstelės išlaiko pagrindinius melanomos žymeklius, tokius kaip S-100, HMB-45 ir Melan-A, o tai patvirtina jų melanocitinę kilmę. Be to, šiai ląstelių linijai būdingas gebėjimas in vitro imituoti vaskulogeninius modelius – reiškinį, susijusį su naviko agresyvumu ir metastazavimo potencialu. MUM2B buvo naudojama melanomos progresavimą skatinančių molekulinių mechanizmų tyrimams, įskaitant apoptozės atsparumo kelių ir mitochondrijų disfunkcijos vaidmenį. Ląstelių linija reaguoja į specifinius apoptozės induktorius, pvz., NOXA, p53 nepriklausomu būdu, o tai pabrėžia jos naudą tiriant terapines strategijas, nukreiptas prieš apoptozei atsparius navikus.
Tyrimai, kuriuose naudojama MUM2B, labai prisidėjo prie potencialių terapinių taikinių, skirtų metastazinei melanomai, identifikavimo. Tyrimai rodo jos jautrumą novatoriškiems junginiams, pavyzdžiui, γ-sekretazės inhibitoriams (GSI), kurie selektyviai indukuoja apoptozę melanomos ląstelėse, tuo pačiu nepažeisdami normalių melanocitų. Šie duomenys pabrėžia MUM2B vaidmenį kaip svarbaus modelio naujų terapinių preparatų bandymams ir metastazuojančios uvealinės melanomos biologijos supratimo gilinimui.

Audinys	Akių obuolys, uvea
Liga	Melanoma

Sinonimai

- MUM-2B
- MuM-2B
- Mum2B

KLASIFIKACIJA

Organizmas	Žmogus
Seksas	Moteris
Augimo savybės	Prisijungęs
Biologinio saugumo lygis	1

IDENTIFIKATORIAI

Nuoroda

MUM2B (Cytion katalogo numeris 305477)

NCBI mokesčių identifikavimo kodas	9606
Cellosaurus	CVCL_3447

LAIKYMAS IR AUGINIMAS

Maitinamoji terpė

RPMI 1640, š: 2,0 mM stabilus glutaminas, š: 2,0 g/L $NaHCO_3$ (Cytion gaminio numeris 820700a)

Inkubacijos aplinka	37 °C, 5 %CO_2, drėkintoje atmosferoje.

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Maisto papildai

Papildykite terpę 10 % FBS

Disociacijos reagentas	Accutase

Atšildymas ir auginimas

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KOKYBĖS KONTROLĖ IR KRIOKONSERVAVIMAS

Sterilumas

Mikoplazmos užterštumas atmetamas taikant PGR pagrįstus tyrimus ir liuminescencinius mikoplazmos aptikimo metodus.
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų užteršimo bakterijomis, grybeliais ar mielėmis, ląstelių kultūros kasdien vizualiai tikrinamos.

Šaldymo terpė	Kaip kriokonservavimo terpę naudojame visišką augimo terpę (įskaitant FBS) + 10 % DMSO, kad būtų užtikrintas tinkamas gyvybingumas po atšildymo, arba CM-1 (Cytion katalogo numeris 800100), kurioje yra optimizuotų osmoprotektorių ir medžiagų apykaitos stabilizatorių, kad būtų pagerintas atsigavimas ir sumažintas kriokonservavimo sukeltas stresas.

Laikymo sąlygos

Norėdami ilgai saugoti, įdėkite buteliukus į garų fazės skystą azotą maždaug -150-196 °C temperatūroje. Laikymas -80 °C temperatūroje yra priimtinas tik kaip trumpas tarpinis etapas prieš perkeliant į skystąjį azotą.

Pristatymo sąlygos

Kriokonservuotos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje su pakankamu kiekiu šaldymo skysčio, kad pervežimo metu būtų palaikoma maždaug -78 °C temperatūra. Gavę pakuotę, nedelsdami ją apžiūrėkite ir nedelsdami perkelkite mėgintuvėlius į tinkamą saugyklą.

DONORAS

Donoro amžius	Nenustatyta
Etninė priklausomybė	Nenustatyta

TEISINIAI IR SAUGOS KLAUSIMAI

Saugos priemonės

Planuojant saugoti kriovaistinę skystame azote, kad ateityje ją būtų galima atšildyti, būtina laikytis griežtų saugos priemonių. Būtina mūvėti tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, o perkeliant užšaldytus mėginius į skystojo azoto talpyklą arba iš jos būtina naudoti veido kaukę arba apsauginius akinius. Taip siekiama sumažinti sužeidimų riziką dėl galimo kriokomponentų sprogimo išėmimo metu, kai gali išsiveržti aštrūs fragmentai.

Garantija

" Cytion" garantuoja savo produktų kokybę ir gyvybingumą.
Garantuojame, kad mūsų ląstelės bus gyvybingos kultūrų auginimo pradžioje 60 dienų po išsiuntimo iš mūsų gamyklos.
Užtikriname, kad visos medžiagos atitinka analizės sertifikate ir (arba) gaminio lape aprašytas specifikacijas
Išsamią informaciją rasite mūsų <a href=""/Kas mes esame/garantijos/" hreflang=""x-default"">Garantijos pareiškime

Reikalinga medžiagų perdavimo sutartis	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB