CBRH7919

305479

معلومات عامة

الوصف

نموذجًا لورم الكبد لدى الجرذان يُستخدم بشكل متكرر في أبحاث السرطان لدراسة آليات سرطان الكبد والتدخلات العلاجية. وقد CBRH7919 يُعد خط الخلايا استُخلصت هذه الخلايا من سرطان الخلايا الكبدية لدى الجرذان، وتتميز بتكاثرها السريع، وتشكل نموذجًا مفيدًا لدراسة تكوّن سرطان الكبد والوظائف الأيضية في تقييم تأثيرات المركبات النشطة بيولوجيًا المختلفة على نمو الخلايا CBRH7919 الخاصة بالكبد. وقد سلطت الدراسات الحديثة الضوء على دور خط الخلايا السرطانية ومسارات الإشارات الخلوية.

استكشاف كيفية تأثير المركبات الطبيعية على تكاثر الخلايا وموت الخلايا المبرمج. على سبيل CBRH7919 ومن المجالات البحثية المهمة التي تشمل خلايا المثال، ثبت أن بلازمالوجينات الكولين (ChoPlas) المستخلصة من كبد الخنازير تثبط تكاثر خلايا CBRH7919. من الناحية الآلية، تبين أن العلاج بـ ChoPlas يؤدي هذا التعديل إلى توقف دورة الخلية. PI3K/Akt مما يؤثر على مسار إشارات ،Bcl-2و (pAkt) يزيد من تعبير الكافولين-1 مع تقليل مستويات الفوسفو-أكت والتي تعد ،D و E والسيكلينات (CDK2، CDK4) مصحوبًا بانخفاض في مستويات الكينازات المعتمدة على السيكلين ،S إلى G1 عند مرحلة الانتقال من منظمات حاسمة لتقدم دورة الخلية.

ويُذكر أن الفوديننين، وهو نظير مقطوع من CBRH7919. وقد ربطت أبحاث إضافية بين التعبير عن بروتينات محددة مثل الفوديننين والتنظيم الأيضي في خلايا ويشير هذا إلى أن CBRH7919. في خلايا GAPDH الجرذ لبروميننين الفأر، يتم تنظيمه صعودًا في ظل ظروف ارتفاع الجلوكوز ويمكنه زيادة التعبير عن نموذجًا قيّمًا CBRH7919 الفوديننين قد يلعب دورًا في استقلاب الجلوكوز، وربما يؤثر على ديناميكيات الطاقة الخلوية واستجابات الإجهاد، مما يجعل خلايا لأبحاث مرض السكري والسرطان المرتبط بالتمثيل الغذائي.

الأنسجة	الكبد
المرض	سرطان الخلايا الكبدية

المرادفات

- CBRH-7919

التصنيف

كائن حي	الجرذ
الجنس	غير محدد
خصائص النمو	الملتزم
مستوى السلامة البيولوجية	1

المعرّفات

المرجع

CBRH7919 (رقم الكتالوج لدى Cytion: 305479)

رقم التعريف الضريبي لدى NCBI	10116
سيلوصور	CVCL_7176

التعامل مع النباتات وزراعتها

وسط الاستزراع

RPMI 1640، 2.0 جم/لتر، ث: 2.0 مللي مولار جلوتامين مستقر، NaHCO3 (820700 رقمa المادة من سايتيون)

بيئة الحضانة	37 درجة مئوية، و5% من ثاني أكسيد الكربون في جو مرطب.

المكملات الغذائية

20 ٪FBS استكمال الوسط ب

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

كاشف التفكك	أكوتاس

إعادة الاستنبات

استخدم 3-5 مل من T25، الذي يفتقر إلى الكالسيوم والمغنيسيوم. بالنسبة لقوارير PBS قم بإزالة الوسط القديم من الخلايا الملتصقة واغسلها باستخدام PBS، دع .T75 و2.5 مل لقوارير T25 استخدم 5-10 مل. ثم، قم بتغطية الخلايا بالكامل باستخدام أكوتاز، باستخدام 1-2 مل لقوارير T75، وبالنسبة لقوارير الخلايا تحتضن في درجة حرارة الغرفة لمدة 8-10 دقائق لفصلها. بعد الحضانة، اخلط الخلايا برفق مع 10 مل من الوسط لإعادة ترسيبها، ثم اطردها مركزيًا بسرعة 300 xg لمدة 3 دقائق. تخلص من المادة الطافية، وأعد غمر الخلايا في وسط جديد وانقلها إلى قوارير جديدة تحتوي بالفعل على وسط جديد.

كثافة البذر	2-4*10^4/سم²

إذابة الثلج والزراعة

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

مراقبة الجودة والحفظ بالتبريد

العقم

وطرق الكشف عن الميكوبلازما القائمة على (PCR) يُستبعد التلوث بالميكوبلازما باستخدام كل من المقايسات القائمة على تفاعل البوليميراز المتسلسل التألق.
ولضمان عدم وجود تلوث بكتيري أو فطري أو خميرة يتم إخضاع مزارع الخلايا للفحص البصري اليومي.

وسط التجميد	من أجل الحفاظ DMSO 10% + (FBS بما في ذلك) كوسيط للحفظ بالتبريد، نستخدم وسط نمو كامل والذي يتضمن مواد حماية ،(رقم Cytion 800100 كتالوج) CM-1 على حيوية كافية بعد ذوبان الجليد أو أسموزموبيروتيكتية ومثبتات أيضية مُحسّنة لتعزيز التعافي وتقليل الإجهاد الناجم عن التبريد.

شروط التخزين

للحفظ طويل الأمد، ضع القوارير في نيتروجين سائل في طور البخار عند درجة حرارة تتراوح بين -150 و -196 درجة مئوية تقريباً. يُقبل التخزين عند درجة حرارة -80 درجة مئوية فقط كخطوة مؤقتة قصيرة قبل النقل إلى النيتروجين السائل.

شروط الشحن

تُشحن خطوط الخلايا المحفوظة بالتبريد على ثلج جاف في عبوات معزولة وموثوقة مع مبرد كافٍ للحفاظ على درجة حرارة -78 درجة مئوية تقريبًا طوال فترة النقل. عند الاستلام، افحص الحاوية على الفور وانقل القوارير دون تأخير إلى المخزن المناسب.

المانح

السلالة / النوع الفرعي	ويستار
عمر المتبرع	غير محدد

الشؤون القانونية والسلامة

احتياطات السلامة

عند التخطيط لتخزين القارورة المبردة في النيتروجين السائل لإذابتها في المستقبل، من الضروري الالتزام بتدابير السلامة الصارمة. من الضروري ارتداء قفازات وملابس واقية مناسبة، كما يلزم استخدام قناع الوجه أو نظارات السلامة أثناء نقل العينات المجمدة من خزان النيتروجين السائل أو إليه. وذلك للتخفيف من خطر الإصابة من الانفجارات المحتملة للنيتروجين المبرد عند الإزالة، والتي يمكن أن تؤدي إلى قذف شظايا حادة.

الضمان

في Cytion، نلتزم في Cytion بجودة منتجاتنا وحيويتها.
نحن نضمن أن تكون خلايانا قابلة للحياة في بداية الاستزراع لمدة 60 يومًا بعد الشحن من منشآتنا.
نؤكد أن جميع المواد مطابقة للمواصفات الموضحة في شهادة التحليل و/أو ورقة المنتج
بيان الضمان<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">للحصول على التفاصيل الكاملة، يُرجى الرجوع إلى

يلزم إبرام اتفاقية نقل المواد	Yes