# CBRH7919

305479

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

### Описание

Клетъчната линия CBRH7919 е модел на хепатома при плъхове, често използван в онкологичните изследвания за проучване на механизмите на рака на черния дроб и терапевтичните интервенции. Тези клетки, получени от хепатоцелуларен карцином при плъхове, се характеризират с бърза пролиферация и служат като полезен модел за изучаване на хепатокарциногенезата и специфичните за черния дроб метаболитни функции. Последните проучвания подчертават ролята на клетъчната линия CBRH7919 при оценката на ефектите на различни биоактивни съединения върху растежа на туморните клетки и сигналните пътища.
Една значима област на изследвания, включваща клетки CBRH7919, е проучването на това как природните съединения влияят върху клетъчната пролиферация и апоптозата. Например, е доказано, че холин-плазмалогените (ChoPlas), извлечени от свински черен дроб, инхибират пролиферацията на клетките CBRH7919. От механична гледна точка е установено, че третирането с ChoPlas увеличава експресията на кавеолин-1, като същевременно намалява нивата на фосфо-Akt (pAkt) и Bcl-2, като по този начин влияе върху сигналния път PI3K/Akt. Тази модулация води до спиране на клетъчния цикъл при прехода G1/S, придружено от намаляване на нивата на циклин-зависимите кинази (CDK2, CDK4) и циклините E и D, които са ключови регулатори на протичането на клетъчния цикъл.
Допълнителни изследвания свързват експресията на специфични протеини като фуденин с метаболитната регулация в клетките CBRH7919. Съобщава се, че фуденинът – съкратен хомолог на проминина при мишките, извлечен от плъхове – се експресира по-силно при условия на висока глюкоза и може да повиши експресията на GAPDH в клетките CBRH7919. Това предполага, че фуденинът може да играе роля в метаболизма на глюкозата и потенциално да повлияе на клетъчната енергийна динамика и реакциите към стрес, което превръща клетките CBRH7919 в ценен модел за изследвания в областта на диабета и раковите заболявания, свързани с метаболизма.

| | |
|---|---|
| **Тъкан** | Черен дроб |
| **Заболяване** | Хепатоцелуларен карцином |

### Синоними

- CBRH-7919

## КЛАСИФИКАЦИЯ

| | |
|---|---|
| **Организъм** | Плъх |
| **Секс** | Не е посочено |
| **Свойства, свързани с растежа** | Привърженик |
| **Ниво на биологична безопасност** | 1 |

## ИДЕНТИФИКАТОРИ

### Източник

CBRH7919 (каталожен номер на Cytion 305479)

| | |
|---|---|
| **Данъчен идентификационен номер в NCBI** | 10116 |
| **Целозавър** | CVCL_7176 |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

## ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ

**Хранителна среда**

RPMI 1640, w: 2,0 mM стабилен глутамин, w: 2,0 g/L NaHCO3 (номер на статията в Cytion 820700a)

| | |
|---|---|
| **Атмосфера за инкубация** | 37°C, 5%CO2, овлажнена атмосфера. |

**Добавки**

Допълнете средата с 20% FBS

| | |
|---|---|
| **Реагент за дисоциация** | Accutase |

**Пресаждане**

Отстранете старата среда от адхезивните клетки и ги промийте с PBS, която не съдържа калций и магнезий. За колби T25 използвайте 3-5 ml PBS, а за колби T75 - 5-10 ml. След това покрийте клетките изцяло с Accutase, като използвате 1-2 ml за колби T25 и 2,5 ml за колби T75. Оставете клетките да се инкубират на стайна температура за 8-10 минути, за да се отделят. След инкубацията внимателно разбъркайте клетките с 10 ml среда, за да ги ресуспендирате, след което центрофугирайте при 300xg за 3 минути. Изхвърлете супернатантата, ресуспендирайте клетките в прясна среда и ги прехвърлете в нови колби, които вече съдържат прясна среда.

| | |
|---|---|
| **Плътност на засяването** | 2–4 × $10^4$/$см^2$ |

**Размразяване и култивиране**

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

## КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

**Стерилност**

Замърсяването с микоплазма се изключва както чрез PCR-базирани анализи, така и чрез луминесцентни методи за откриване на микоплазма.
За да се гарантира, че няма бактериално, гъбично или дрождево замърсяване, клетъчните култури се подлагат на ежедневни визуални проверки.

| | |
|---|---|
| **Среда за замразяване** | Като среда за криоконсервация използваме пълна среда за растеж (включително FBS) + 10% DMSO за адекватна жизнеспособност след размразяване или CM-1 (каталожен номер 800100 на Cytion), която включва оптимизирани осмопротектори и метаболитни стабилизатори за подобряване на възстановяването и намаляване на криоиндуцирания стрес. |

**Условия за съхранение**

За дълготрайно съхранение поставете флаконите в течен азот в парна фаза при температура около -150 до -196 °C. Съхранението при -80 °C е приемливо само като кратък междинен етап преди прехвърлянето в течен азот.

**Условия за доставка**

Криоконсервираните клетъчни линии се транспортират върху сух лед в утвърдени, изолирани опаковки с достатъчно хладилен агент, за да се поддържа приблизително -78 °C по време на транспортирането. При получаването незабавно прегледайте опаковката и незабавно прехвърлете флаконите за подходящо съхранение.

## ДАРИТЕЛ

| | |
|---|---|
| **Порода / подвид** | Wistar |
| **Възраст на донора** | Неуточнено |

## ПРАВНИ ВЪПРОСИ И БЕЗОПАСНОСТ

**Мерки за безопасност**

Когато планирате да съхранявате криопрепарат в течен азот за бъдещо размразяване, е задължително да спазвате строги мерки за безопасност. Подходящите защитни ръкавици и облекло са от съществено значение, а по време на прехвърлянето на замразени проби към или от резервоара с течен азот е необходимо да се използва маска за лице или предпазни очила. Това се прави, за да се намали рискът от нараняване от потенциални експлозии на криовиолите при изваждането им, които могат да доведат до изхвърляне на остри фрагменти.

**Гаранция**

Ние в Cytion заставаме зад качеството и жизнеспособността на нашите продукти.
Гарантираме, че нашите клетки ще бъдат жизнеспособни в началото на култивирането в продължение на 60 дни след изпращането им от нашите съоръжения.
Гарантираме, че всички материали отговарят на спецификациите, описани в сертификата за анализ и/или продуктовата листа
За пълни подробности, моля, направете справка с нашата <a href=""/Кои сме ние/Гаранция/"" hreflang=""x-default"">Гаранционна декларация

| | |
|---|---|
| **Необходимо е споразумение за прехвърляне на материали** | Yes |

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB