OCI-LY3

305480

INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição

A OCI-LY3 é uma linha celular humana de linfoma difuso de grandes células B (DLBCL) derivada de um gânglio linfático maligno de um doente com DLBCL do subtipo semelhante às células B ativadas (ABC). Este subtipo está associado a um prognóstico mais desfavorável em comparação com outras formas de DLBCL e caracteriza-se pela ativação constitutiva da via de sinalização NF-κB. Como modelo representativo do DLBCL do subtipo ABC, a OCI-LY3 é amplamente utilizada na investigação sobre linfomas, nomeadamente para estudar a biologia tumoral, identificar vulnerabilidades moleculares e testar novas estratégias terapêuticas.
As células OCI-LY3 crescem em suspensão e apresentam características típicas das células B malignas, incluindo a expressão de marcadores de superfície associados à linhagem das células B maduras. A linha celular apresenta alterações genéticas fundamentais, comumente observadas no ABC-DLBCL, tais como mutações que afetam a via de sinalização do recetor das células B (BCR), a sinalização dos recetores Toll-like e componentes da via NF-κB, incluindo CARD11 e MYD88. Estas características tornam a OCI-LY3 particularmente adequada para investigar os mecanismos moleculares que impulsionam a ativação do NF-κB — uma característica distintiva do ABC-DLBCL — e o seu papel na promoção da sobrevivência celular e da resistência à apoptose.
A OCI-LY3 é um modelo essencial para estudos pré-clínicos destinados a avaliar a eficácia de terapias direcionadas, incluindo inibidores da sinalização do NF-κB, da sinalização do BCR e de proteínas antiapoptóticas, como a BCL-2. Os investigadores também utilizam esta linha celular para estudar mecanismos de resistência aos fármacos e para testar terapias combinadas concebidas para superar a resistência em subtipos agressivos de linfoma. A sua relevância para o subtipo ABC do DLBCL torna a OCI-LY3 um recurso inestimável para aprofundar a compreensão deste linfoma de alto risco e para desenvolver tratamentos inovadores e mais eficazes.

Tecido	Medula óssea
Doença	Linfoma de células B

Sinónimos

- OCI-LY3
- OCI-ly3
- OCI-LY-3
- Oci-Ly-3
- OCI-Ly 3
- OCILY-3
- OCI-Ly03
- OCI Ly3
- OCILY3
- Ly3
- LY3

CLASSIFICAÇÃO

Organismo	Humano
Sexo	Masculino
Propriedades de crescimento	Suspensão
Nível de biossegurança	1

CARACTERÍSTICAS

Morfologia	De tipo epitelial

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Tempo de duplicação	24 horas

IDENTIFICADORES

Referência

OCI-LY3 (número de catálogo da Cytion 305480)

Número de identificação fiscal do NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_8800

EXPRESSÃO E SUSCETIBILIDADE

Expressão do antígeno

CD3 -, CD10 -, CD13 -, CD19 (+), CD20 +, CD34 -, CD37 +, cyCD79a +, CD80 +, CD138 -, HLA-DR+, sm/cyIgG+, sm/cyIgM-, sm/cykappa-, sm/cylambda+; no artigo referido, esta linha celular é descrita como cykappa+;

Perfil mutacional

Fusão génica: IGH + HGNC, 11242, SPIB, Nome(s) = IGH-SPIB; Mutação: CARD11, Simples, p.Leu251Pro (c.752T>C) (L244P), Homozigótica; Mutação: MYD88, simples, p.Leu252Pro (c.755T>C) (L265P), homozigótica

Vírus

HBV -, HCV -, VIH-1 -, VIH-2 -, MLV -

MANUSEAMENTO E CULTURA

Meio de cultura

RPMI 1640, com: 2,0 mM de glutamina estável, com: 2,0 g/L NaHCO3 (número de artigo Cytion 820700a)

Atmosfera de incubação	37°C, 5%CO2, atmosfera humidificada.

Suplementos

Completar o meio com 20% de FBS inactivado pelo calor

Subcultura

Semeie a uma concentração de cerca de 0,2-0,3 x 10^6 células/ml, de preferência numa placa de 12 ou 24 poços; após a descongelação, a viabilidade celular pode chegar a ser de apenas 50%, mas as células devem recuperar rapidamente no espaço de uma semana;

Renovação de fluidos	2 a 3 vezes por semana

Descongelamento e cultura

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

CONTROLO DE QUALIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO

Esterilidade

A contaminação por micoplasma é excluída utilizando ensaios baseados em PCR e métodos de deteção de micoplasma baseados em luminescência.
Para garantir que não há contaminação bacteriana, fúngica ou de leveduras, as culturas de células são sujeitas a inspecções visuais diárias.

Meio de congelação	Como meio de criopreservação, utilizamos um meio de crescimento completo (incluindo FBS) + 10% DMSO para uma viabilidade pós-descongelamento adequada, ou CM-1 (número de catálogo Cytion 800100), que inclui osmoprotectores optimizados e estabilizadores metabólicos para melhorar a recuperação e reduzir o stress induzido pela crio.

Condições de armazenamento

Para conservação a longo prazo, colocar os frascos em azoto líquido em fase de vapor a uma temperatura entre -150 e -196 °C. O armazenamento a -80 °C é aceitável apenas como um curto passo intermédio antes da transferência para azoto líquido.

Condições de envio

As linhas celulares criopreservadas são expedidas em gelo seco em embalagens validadas e isoladas com refrigerante suficiente para manter aproximadamente -78 °C durante o transporte. Aquando da receção, inspecionar imediatamente o recipiente e transferir sem demora os frascos para um local de armazenamento adequado.

DOADOR

Idade do dador	52 anos
Etnia	Caucasiano

ASPECTOS LEGAIS E DE SEGURANÇA

Precauções de segurança

Quando se planeia armazenar um criovial em nitrogénio líquido para descongelação futura, é obrigatório aderir a medidas de segurança rigorosas. Luvas e vestuário de proteção adequados são essenciais, e a utilização de uma máscara facial ou óculos de segurança é necessária durante a transferência de amostras congeladas para ou do tanque de nitrogénio líquido. Isto destina-se a mitigar o risco de ferimentos provocados por potenciais explosões de crioviais após a remoção, que podem resultar na projeção de fragmentos afiados.

Garantia

Na Cytion, nós garantimos a qualidade e a viabilidade de nossos produtos.
Garantimos que nossas células serão viáveis no início da cultura por 60 dias após o envio de nossas instalações.
Asseguramos que todos os materiais estão em conformidade com as especificações descritas no Certificado de Análise e/ou Folha de Produto
Para mais informações, consulte a nossa <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Declaração de Garantia

É necessário um Acordo de Transferência de Material	Yes