OCI-LY3

305480

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Popis

OCI-LY3 je ľudská bunková línia difúzneho veľkobunkového B-bunkového lymfómu (DLBCL) odvodená z malígneho lymfatického uzla pacienta s DLBCL podtypu podobného aktivovaným B-bunkám (ABC). Tento podtyp je spojený s horšou prognózou v porovnaní s inými formami DLBCL a vyznačuje sa konštitutívnou aktiváciou signálnej dráhy NF-κB. Ako reprezentatívny model ABC-DLBCL sa OCI-LY3 široko využíva vo výskume lymfómov, najmä na štúdium biológie nádorov, identifikáciu molekulárnych slabín a testovanie nových terapeutických stratégií.
Bunky OCI-LY3 rastú v suspenzii a vykazujú vlastnosti typické pre malígne B-bunky, vrátane expresie povrchových markerov spojených s líniou zrelých B-buniek. Táto bunková línia obsahuje kľúčové genetické zmeny bežne pozorované pri ABC-DLBCL, ako sú mutácie ovplyvňujúce signálnu dráhu receptora B-buniek (BCR), signálnu dráhu Toll-like receptorov a zložky dráhy NF-κB, vrátane génov CARD11 a MYD88. Vďaka týmto vlastnostiam je OCI-LY3 obzvlášť vhodná na skúmanie molekulárnych mechanizmov riadiacich aktiváciu NF-κB, čo je charakteristický znak ABC-DLBCL, a jej úlohy pri podporovaní prežitia buniek a odolnosti voči apoptóze.
OCI-LY3 je nevyhnutným modelom pre predklinické štúdie zamerané na hodnotenie účinnosti cielených terapií, vrátane inhibítorov signálnej dráhy NF-κB, signálnej dráhy BCR a antiapoptotických proteínov, ako je BCL-2. Výskumníci túto bunkovú líniu využívajú aj na štúdium mechanizmov liekovej rezistencie a na testovanie kombinovaných terapií určených na prekonanie rezistencie u agresívnych podtypov lymfómu. Vďaka jej relevancii pre podtyp ABC DLBCL je OCI-LY3 neoceniteľným zdrojom pre hlbšie pochopenie tohto vysoko rizikového lymfómu a pre vývoj nových, účinnejších liečebných postupov.

Tkanivo	Kostná dreň
Choroba	B-bunkový lymfóm

Synonymá

- OCI-LY3
- OCI-ly3
- OCI-LY-3
- Oci-Ly-3
- OCI-Ly 3
- OCILY-3
- OCI-Ly03
- OCI Ly3
- OCILY3
- Ly3
- LY3

KLASIFIKÁCIA

Organizmus	Človek
Sex	Muž
Rastové vlastnosti	Zavesenie
Úroveň biologickej bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKY

Morfológia	Epitelu podobné
Doba zdvojnásobenia	24 hodín

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

IDENTIFIKÁTORY

Citácia

OCI-LY3 (katalógové číslo Cytion 305480)

Daňové identifikačné číslo NCBI	9606
Cellosaurus	CVCL_8800

PREJAV A NÁCHYLNOSŤ

Expresia antigénu

CD3 -, CD10 -, CD13 -, CD19 (+), CD20 +, CD34 -, CD37 +, cyCD79a +, CD80 +, CD138 -, HLA-DR+, sm/cyIgG+, sm/cyIgM-, sm/cykappa-, sm/cylambda+; v citovanej štúdii je táto bunková línia opísaná ako cykappa+;

Mutčný profil

Génová fúzia: IGH + HGNC, 11242, SPIB, Názov(-y) = IGH-SPIB; Mutácia: CARD11, jednoduchá, p.Leu251Pro (c.752T>C) (L244P), homozygotná; Mutácia: MYD88, jednoduchá, p.Leu252Pro (c.755T>C) (L265P), homozygotná

Vírusy

HBV -, HCV -, HIV-1 -, HIV-2 -, MLV -

MANIPULÁCIA A KULTIVÁCIA

Kultivačné médium

RPMI 1640, w: 2,0 mM stabilný glutamín, w: 2,0 g/L NaHCO3 (číslo výrobku Cytion 820700a)

Inkubačná atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.

Doplnky stravy

Doplňte médium o 20 % tepelne inaktivovanej FBS

Rozmnožovanie kultúr

Vysádzajte pri koncentrácii cca 0,2–0,3 × 10^6 buniek/ml, najlepšie v 12- alebo 24-jamkovej platničke; po rozmrazení môže životaschopnosť buniek klesnúť až na 50 %, bunky by sa však mali rýchlo zotaviť v priebehu týždňa;

Obnova kvapaliny	2 až 3-krát týždenne

Rozmrazovanie a kultivácia

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVÁCIA

Sterilita

Kontaminácia mykoplazmami sa vylučuje pomocou testov založených na PCR a metód detekcie mykoplaziem založených na luminiscencii. Aby sa zabezpečilo, že nedošlo ku kontaminácii baktériami, hubami alebo kvasinkami, bunkové kultúry sa denne vizuálne kontrolujú.

Mrazové médium	Ako kryokonzervačné médium používame kompletné rastové médium (vrátane FBS) + 10 % DMSO na zabezpečenie primeranej životaschopnosti po rozmrazení alebo CM-1 (katalógové číslo 800100 spoločnosti Cytion), ktoré obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory na zlepšenie obnovy a zníženie stresu spôsobeného kryo.

Podmienky skladovania

Na dlhodobé uchovávanie umiestnite injekčné liekovky do kvapalnej fázy dusíka v pare pri teplote približne -150 až -196 °C. Skladovanie pri teplote -80 °C je prijateľné len ako krátky prechodný krok pred presunom do tekutého dusíka.

Dopravné podmienky

Kryokonzervované bunkové línie sa prepravujú na suchom ľade v overených, izolovaných obaloch s dostatočným množstvom chladiva na udržanie teploty približne -78 °C počas celej prepravy. Po prijatí ihneď skontrolujte obal a bezodkladne premiestnite injekčné liekovky do vhodného skladu.

DARCA

Vek darcu	52 rokov
Etnická príslušnosť	Kaukazský

PRÁVNE INFORMÁCIE A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

Pri plánovaní uskladnenia kryovírusu v kvapalnom dusíku na budúce rozmrazenie je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Vhodné ochranné rukavice a odev sú nevyhnutné a počas prenosu zmrazených vzoriek do nádrže s tekutým dusíkom alebo z nej sa vyžaduje používanie tvárovej masky alebo ochranných okuliarov. Je to z dôvodu zníženia rizika poranenia v dôsledku možnej explózie kryovírusu pri vyberaní, ktorá môže mať za následok vymrštenie ostrých úlomkov.

Záruka

V spoločnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopnosťou našich produktov.
Garantujeme, že naše bunky budú životaschopné na začiatku kultivácie počas 60 dní po odoslaní z našich zariadení.
Zaručujeme, že všetky materiály zodpovedajú špecifikáciám opísaným v certifikáte analýzy a/alebo v produktovom liste
Úplné informácie nájdete v našom <a href=""/Kto sme/záruka/"" hreflang=""x-default"">Vyhlásení o záruke

Je potrebná dohoda o prenose materiálu	Yes