SNB-19

305492

GENERAL INFORMATION

Description

La lignée cellulaire SNB-19 est un modèle de glioblastome multiforme (GBM) humain dérivé d'un gliome de haut grade. Elle fait partie des lignées cellulaires de gliome les plus étudiées et sert à explorer la biologie des tumeurs cérébrales agressives, en particulier le glioblastome. Les cellules SNB-19 présentent une morphologie épithéliale et sont adhérentes en culture. Elles ont été largement utilisées dans des études sur la prolifération tumorale, l'invasion et la réponse au traitement, notamment pour étudier les mécanismes de résistance du glioblastome aux traitements conventionnels.
Le profilage génomique des cellules SNB-19 a révélé d'importantes altérations génétiques couramment associées au GBM, notamment des mutations dans des gènes suppresseurs de tumeurs et des oncogènes tels que TP53, EGFR et PTEN. Ces cellules présentent également des anomalies chromosomiques, notamment l'amplification de gènes oncogènes moteurs et des délétions au niveau des loci des gènes suppresseurs de tumeurs. Le profil génétique de la lignée SNB-19 constitue un modèle important pour l'étude des voies moléculaires à l'origine de la pathogenèse du GBM et pour l'identification de cibles thérapeutiques potentielles.
La lignée SNB-19 a été largement utilisée pour évaluer l'efficacité de nouveaux agents chimiothérapeutiques et de médicaments ciblés. Elle est également employée dans des essais visant à étudier les propriétés invasives et migratoires du glioblastome, car elle reproduit efficacement in vitro la nature hautement invasive du GBM. De plus, les analyses protéomiques de la lignée SNB-19 ont contribué à la compréhension des dérèglements au niveau protéique et de leur corrélation avec les altérations génétiques du glioblastome. Ces caractéristiques font de la lignée SNB-19 un outil essentiel dans la recherche translationnelle axée sur le glioblastome.

Tissue	Cerveau, lobe pariétal
Disease	Astrocytome

Synonyms

- SNB.19
- SNB19
- Surgical Neurology Branch-19

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	De type fibroblaste
Cell type	Fibroblaste
Doubling time	24 heures

IDENTIFIERS

Citation

SNB-19 (numéro de catalogue Cytion 305492)

NCBI TaxID	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_0535

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Mutational profile

Mutation : PTEN, simple, p.Glu242Valfs*15 (c.723_724dupTG), homozygote; Mutation : TERT, simple, c.1-124C>T (c.228C>T) (C228T), non précisée; Mutation : TP53, simple, p.Arg273His (c.818G>A), homozygote

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM, p/v : 4,5 g/L de glucose, p/v : 4 mM de L-glutamine, p/v : 3,7 g/L de $NaHCO_3$, p/v : 1,0 mM de pyruvate de sodium (référence Cytion 820300a)

Incubation atmosphere	37 °C, 5 % de CO_2, atmosphère humidifiée.

Supplements

Ajouter 10 % de FBS au milieu de culture

Seeding density	1 à 4 × 10^4 cellules/cm^2
Fluid renewal	2 à 3 fois par semaine

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

La contamination par les mycoplasmes est exclue à l'aide de tests basés sur la PCR et de méthodes de détection des mycoplasmes par luminescence.
Afin de s’assurer qu’il n’y a aucune contamination bactérienne, fongique ou par des levures, les cultures cellulaires font l’objet d’inspections visuelles quotidiennes.

Freeze medium	Comme milieu de cryoconservation, nous utilisons un milieu de croissance complet (contenant du sérum fœtal bovin) + 10 % de DMSO pour assurer une viabilité adéquate après décongélation, ou du CM-1 (référence Cytion 800100), qui contient des osmoprotecteurs et des stabilisateurs métaboliques optimisés pour améliorer la récupération et réduire le stress induit par la cryoconservation.

Storage conditions

Pour une conservation à long terme, placez les flacons dans de l’azote liquide en phase vapeur à une température comprise entre environ −150 et −196 °C. L’entreposage à −80 °C n’est acceptable qu’à titre d’étape intermédiaire de courte durée avant le transfert dans l’azote liquide.

Shipping conditions

Les lignées cellulaires cryoconservées sont expédiées dans de la glace sèche, dans un emballage isotherme validé contenant suffisamment de réfrigérant pour maintenir une température d'environ −78 °C pendant tout le transport. À la réception, inspectez immédiatement le conteneur et transférez sans délai les flacons dans un lieu de stockage approprié.

DONOR

Donor age	75 ans
Ethnicity	caucasien

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

Lorsqu'on prévoit entreposer un cryotube dans de l'azote liquide en vue d'une décongélation ultérieure, il est impératif de respecter des mesures de sécurité rigoureuses. Le port de gants et de vêtements de protection appropriés est essentiel, et l'utilisation d'un masque facial ou de lunettes de protection est obligatoire lors du transfert d'échantillons congelés vers ou depuis le réservoir d'azote liquide. Cette précaution vise à réduire le risque de blessure causé par d'éventuelles explosions de cryotubes lors de leur retrait, pouvant entraîner la projection de fragments coupants.

Warranty

Chez Cytion, nous garantissons la qualité et la viabilité de nos produits.
Nous garantissons que nos cellules seront viables au début de la culture pendant
60 jours à compter de leur expédition depuis nos installations.
Nous assurons que tous les matériaux sont conformes aux spécifications décrites dans le
certificat d'analyse et/ou la fiche technique du produit.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre
déclaration de garantie.

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB